

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**Учреждение образования  
«Международный государственный экологический институт  
имени А.Д. Сахарова»  
Белорусского государственного университета**

**ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

**КАФЕДРА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И РАДИОБИОЛОГИИ**

**ЭКТОПИИ И ЭРОЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН  
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТОВ**

**Дипломная работа**

Специальность 1-33 01 05 Медицинская экология

**Исполнитель:**

студент 6 курса группы 23072

заочной формы обучения \_\_\_\_\_ Кирщенья Наталья Александровна

**Научный руководитель:**

канд. биол. наук, доцент

\_\_\_\_\_ Синелёва Марина Васильевна

**К защите допущена:**

**Заведующий кафедрой экологической  
медицины и радиобиологии**

доктор мед. наук, профессор

\_\_\_\_\_ Батян А.Н.

МИНСК 2018

## РЕФЕРАТ

**Дипломная работа:** Эктопии и эрозии шейки матки у женщин различных возрастов: 40 страниц, 17 рисунков, 5 таблиц, 35 источников.

ЭРОЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ, ШЕЙКА МАТКИ, ПСЕВДОЭРОЗИЯ, ПРОБА ШИЛЛЕРА, КОЛЬПОСКОПИЯ, ДИАТЕРМОКОАГУЛЯЦИЯ, КРИОДЕСТРУКЦИЯ.

**Цель работы:** изучение особенностей эрозии шейки матки у женщин различных возрастов на примере диспансерной группы «УЗ 37 городской поликлиники» города Минска.

**Методы исследований:** анамнестические, клинические, статистические.

**Полученные результаты и их новизна.** Показано, что встречаемость эрозии шейки матки выше у женщин от 25 до 35 лет (68,6% от количества женщин, состоящих на учёте). Преобладающим типом патологии в данной возрастной группе является псевдоэрозия. При лечении эрозии шейки матки наиболее эффективными являются хирургические методы лечения – 93,3% выздоровлений. Наиболее частым осложнением, возникшим в результате несвоевременного лечения эрозии шейки матки, являются ретенционные кисты шейки матки (56% случаев) и гиперплазия эндоцервикса (18,8%).

**Степень использования.** Полученные в ходе исследования результаты представляют практическую значимость и могут быть использованы при подготовке к семинарам, написании рефератов по смежным темам.

**Область применения.** Образование, биология, медицина.

## РЭФЕРАТ

**Дыпломная праца:** Эктапіі і эрозіі шыйкі маткі ў жанчын розных узростаў: 40 старонак, 17 малюнкаў, 5 табліц, 35 крыніц.

ЭРОЗИЯ ШЫЙКИ МАТКИ, ШЫЙКА МАТКИ, ПСЕУДАЭРОЗИЯ, СПРОБА ШЫЛЕРА, КАЛЬПАСКАПИЯ, ДЫАТЭРМАКААГУЛЯЦЫЯ, КРЫЮДЗЕСТРУКЦЫЯ.

**Мэта працы:** вывучэнне асаблівасцяў эрозіі шыйкі маткі ў жанчын розных узростаў на прыкладзе диспансерной групы «УАЗ 37 гарадской паліклінікі» горада Мінска.

**Метады даследавання:** апісальна-аналітычны, параўнальна-супастаўляльны, статыстычны.

**Атрыманыя вынікі і іх навізна.** Паказана, што сустракаецца эрозія шыйкі маткі вышэй у жанчын ад 25 да 35 гадоў (68,6% ад колькасці жанчын, якія стаяць на ўліку). Пераважным тыпам паталогіі ў дадзенай узроставай групе з'яўляецца псеудаэрозія. Пры лячэнні эрозіі шыйкі маткі найбольш эфектыўнымі з'яўляюцца хірургічныя метады лячэння – 93,3% выздараўленне. Найбольш частымі ўскладненнямі, якія ўзніклі ў выніку несвоечасовага лячэння эрозіі шыйкі маткі, з'яўляюцца ретенцыйныя кісты шыйкі маткі (56% выпадкаў) і гіперплазія эндоцервікса (18,8%).

**Ступень выкарыстання.** Атрыманыя ў ходзе даследавання вынікі ўяўляюць практычную значнасць і могуць быць выкарыстаны пры падрыхтоўцы да семінараў, напісанні рэфератаў па сумежных тэмах.

**Вобласць прымянення.** Адукацыя, біялогія, медыцына.

## ABSTRACT

***Diploma work:*** Ectopia and cervical erosion in women of different ages: 40 pages, 17 figures, 5 tables, 35 sources.

CERVICAL EROSION, CERVIX UTERI, PSEUDO-EROSION, SCHILLER'S TEST, COLPOSCOPY, DIATHERMORCOAGULATION, CRYOLYSIS

***The aim of this work:*** study of the peculiarities of the cervical erosion in women of different ages on the example cohort of the "37 city polyclinic" of the city of Minsk.

***Method of research:*** anamnestic, clinical, statistical.

***The results obtained and their novelty.*** It is shown that the incidence of cervical erosion is higher in women from 25 to 35 years (68.6% of the number of women registered). The predominant type of pathology in this age group is pseudoerosion. In the treatment of cervical erosion surgical treatments are the most effective – 93.3% recovery. The most frequent complications resulting from delayed treatment of cervical erosion, are retention cysts of the cervix (56% of cases) and hyperplasia of endocervix (18.8 per cent).

***Degree of use.*** The results obtained during the research are of practical importance and can be used in preparation for seminars, writing abstracts on related topics.

***Area of use.*** Education, biology, medicine.