

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра ботаники**

**МИРОНОВИЧ
Яна Владимировна**

**ФИТОПАТОГЕННЫЕ МИКРОМИЦЕТЫ
ГОРОДА ЖЛОБИНА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ**

Аннотация дипломной работы

**Научный руководитель:
кандидат биологических наук,
доцент А. К. Храмцов**

Допущена к защите

«__» _____ 2015

**Зав. кафедрой ботаники,
кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент В. Д. Поликсенова**

Минск, 2015

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 65 с., 13 рис., 5 табл., 58 источников.

**ФИТОПАТОГЕННЫЕ МИКРОМИЦЕТЫ, РАСТЕНИЕ-ХОЗЯИН,
ГОРОД ЖЛОБИН, УРБАНИЗИРОВАННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, СТЕПЕНЬ
ПОРАЖЕНИЯ, ВСТРЕЧАЕМОСТЬ, МИКОЗ.**

Объект исследований: фитопатогенные микромицеты г. Жлобина и его окрестностей.

Цель: комплексное изучение микроскопических грибов и грибоподобных организмов, поражающих растения в г. Жлобине и его окрестностях.

Использован детально-маршрутный метод микологических и фитопатологических исследований.

Выявлено 72 вида фитопатогенных микромицетов (из них 62 вида новые для г. Жлобина) из 39 родов, 14 семейств, 10 порядков, 8 классов, 4 отделов (Oomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota), 2 царств (Stramenopila и Fungi). Доминировали аnamорфные грибы – 35 видов (48,6 %).

Фитопатогенные микромицеты явились причиной 24 микозов культурных и дикорастущих цветковых растений 60 видов, 56 родов и 29 семейств.

Результаты исследований необходимо учитывать при разработке мероприятий по защите культурных растений от микозов. Данные могут быть полезными при инвентаризации микробиоты Беларуси, прогнозировании распространения вредоносных патогенов на другие урбанизированные территории и расширения у патогенов круга растений-хозяев.

РЭФЕРАТ

Дыпломная работа: 65 с., 13 мал., 5 табл., 58 крыніц.

ФІТАПАТАГЕННЫЯ МІКРАМІЦЭТЫ, РАСЛІНА-ГАСПАДАР, ГОРАД ЖЛОБІН, УРБАНІЗАВАНЯ ТЭРЫТОРЫЯ, СТУПЕНЬ ПАШКОДЖАННЯ, СУСТРАКАЕМАСІЦЬ, МІКОЗ.

Аб'ект даследаванняў: фітапатагенные мікраміцэты г. Жлобіна і яго наваколля.

Мэта: комплекснае вывучэнне мікрасакапічных грыбоў і грыбаподобных арганізмаў, якія пашкоджваюць расліны ў г. Жлобіне і яго наваколлі.

Скарыстаны дэталёва-маршрутны метад мікалагічных і фітапаталагічных даследаванняў.

Выяўлены 72 віды фітапатагенных мікраміцэтаў (з іх 62 віды, новыя для г. Жлобіна) з 39 родаў, 14 сямействаў, 10 парадкаў, 8 класаў, 4 аддзелаў (Oomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota), 2 царстваў (Stramenopila і Fungi). Дамінавалі анаморфныя грыбы – 35 відаў (48,6%).

Фітапатагенные мікраміцэты з'явіліся прычынай 24 мікоазаў культурных і дзікарослых кветковых раслін 60 відаў, 56 родаў і 29 сямействаў.

Вынікі даследаванняў неабходна ўлічваць пры распрацоўцы мерапрыемстваў па ахове культурных раслін ад мікоазаў. Даныя могуць быць карыснымі пры інвентарызацыі мікабіеты Беларусі, прагназаванні распаўсюджвання шкоданосных патагенаў на іншыя ўрбанізаваныя тэрыторыі і пашырэнні ў патагенаў кола раслін-гаспадароў.

ABSTRACT

Diploma work: 65 p., 13 fig., 5 tables, 58 sources.

**PHYTOPATHOGENIC MICROMYCETES, HOST PLANT, ZHLOBIN,
THE URBANIZED TERRITORY, THE DEGREE OF DAMAGE, FREQUENCY
OF OCCURRENCE, MYCOSIS.**

Object of research: phytopatogenic micromycetes of Zhlobin and its surroundings.

Aim of work: to conduct a comprehensive study of phytopatogenic micromycetes in north-eastern part of Zhlobin and its surroundings.

Detailed-route method of mycological and phytopathologic research were used.

It was identified 72 species of phytopathogenic micromycetes (62 of them are new for Zhlobin) from 39 genus, 14 families, 10 orders, 8 classes, 4 divisions (Oomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota), 2 kingdoms (Stramenopila, Fungi). Anamorphic fungi dominated – 35 species (48,6 %).

Phytopathogenic micromycetes were the cause of 24 mycosis of cultural and wild flowering plants of 60 species, 56 genus and 29 families.

The research results must be considered when developing measures for the protection of cultural plants from fungal infections. The data can be useful for inventory of mycobiota of Belarus, forecasting, dissemination of harmful pathogens to other urbanized areas with similar conditions and for expansion of pathogens range of host plants.