степень индукции гена *PR-1B* была существенно выше, чем при использовании клеток немутантного штамма.

С учетом имеющихся в литературе сведений по контролю экспрессии *PR*-генов *S. lycopersicum* наши данные позволяют говорить о двойной роли белка DspE бактерий *Pca* при взаимодействии с этими растениями. С одной стороны, продукция этого белка немутантными бактериями (и доставка его в клетки растений) очевидно усиливает индукцию нескольких *PR*-генов (*PR-2*, *PR-5x* и *PR-5*), что соответствует характеру наблюдаемого взаимодействия бактерий с устойчивыми растениями. С другой стороны, существенно большая индукция *PR-1B* клетками штамма дикого типа в сравнении с клетками *dspE*-мутанта может свидетельствовать об участии эффекторного белка DspE в супрессии этого *PR*-гена растения, что может быть выгодным для патогена при инфекции чувствительного растения. Следует также отметить несколько неожиданную DspE-независимую индукцию маркера РГ (HSR515) в клетках листьев, непосредственно не контактировавших с патогеном.

1. Николайчик Е.А., Овчинникова Т.В., Валентович Л.Н., Губич О.И., Шолух М.В., Евтушенков А.Н. Транслокация белка DspE фитопатогенными бактериями *Erwinia carotovora* subsp. *atroseptica* в клетки *Nicotiana tabacum* и его необходимость для индукции реакции гиперчувствительности // Доклады НАН Беларуси. 2005. Т.49, №5. с. 81-85
2. Николайчик Е.А., Лагоненко А.Л., Валентович Л.Н., Присяженко О.К., Евтушенков А.Н. Сравнительная характеристика харпинов HrpN *Erwinia carotovora* и *Erwinia amylovora* // Докл. НАН Б. 2007. Т.51, №3. С. 81-85
3. Лагоненко А.Л., Николайчик Е.А., Евтушенков А.Н. Характеристика харпина HrpW бактерий *Erwinia carotovora* subsp. *atroseptica* // Докл. НАН Б. 2006. Т.50, №1. С. 70-73.

ИЗУЧЕНИЕ ОТВЕТА НА ХОЛОД И ЯРКИЙ СВЕТ МУТАНТА *NFZ24 ARABIDOPSIS THALIANA*

М.Г. Новокрещенова

Биологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия
maria.novok@gmail.com

Холодовой стресс один из главных лимитирующих факторов развития и продуктивности растений в России. Адаптация растений к стрессу включает как морфологические, физиологические так и биохимические изменения. Один из важнейших регуляторов, который контролирует не только рост и развитие, но и ответы на воздействия окружающей среды, является гормон абсцизовая кислота (АБК). АБК играет важную роль во многих клеточных процессах и ответах на абиотические стрессы, в том числе низкую температуру. Анализ мутантов с измененной чувствительностью к стрессовым факторам – один из эффективных методов выявления генов, контролирующих адаптивный ответ. *Arabidopsis thaliana* является модельным растением, геном которого полностью секвенирован и для которого получены мутанты с измененной чувствительностью к разным абиотическим факторам. К сожалению, большинство исследований таких мутантов ограничиваются анализом чувствительности/устойчивости к отдельным стрессовым факторам, что не позволяет оценить всех последствий мутационных изменений для растения, а значит и перспектив использования мутантных генов этого вида для улучшения адаптивных свойств у хозяйственно ценных растений.

В данной работе исследован мутант *nfz24*, выделенный на кафедре генетики МГУ с помощью химического мутагенеза по устойчивости к индуктору окислительного стресса гербициду норфлуразону, который ингибирует биосинтез каротиноидов, вызывает фотодеструкцию хлорофилла и гибель растений. Мутант *nfz24* имеет светлую желто-зеленую окраску листьев и стебля, и, по данным проведенных ранее исследований,

проявляет перекрестную устойчивость к другому индуктору окислительного стресса – параквату. В то же время, при воздействии низких положительных температур мутант *nfz24* показывает большую чувствительность к холоду, чем растения дикого типа расы *Dijon-M* [1, 2]. Такая высокая чувствительность мутанта *nfz24* к гипотермии может быть связана с дефицитом каротиноидах (до 30 % от дикого типа), хотя по соотношению разных форм каротиноидов растения мутанта и дикого типа практически не различались (рис. 1).

Рис. 1. Хроматограмма содержания пигментов в контрольной расе *Dijon-M* (серая линия) и в мутанте *nfz24* (черная линия).

Методом полуколичественного ПЦР-анализа продуктов обратной транскрипции (ОТ-ПЦР) изучили экспрессию генов АБК-зависимого и АБК-независимого ответа на холодовой стресс в растениях, выращиваемых при температуре +20 °С (контроль) и подвергнутых холодовому воздействию (+4 °С). Уровень экспрессии АБК-зависимого гена *RAB18*, который кодирует гидрофильный белок из семейства дегидринов, в растениях мутантной линии оказался в три раза ниже в контрольных условиях, чем в растениях дикого типа (рис. 2).

Рис. 2. Относительный уровень транскрипции генов холодового ответа *ABA1*, *COR15A*, *CBF1* и *RAB18* в растениях дикого типа (серый) и мутанта *nfz24* (черный). Данные ОТ-ПЦР и рассчитанный по ним относительный уровень экспрессии генов. Содержание кДНК выравнивали по контрольному гену *UBS*.

Ранее было показано, что существует прямая зависимость концентрации мРНК гена *RAB18* от содержания АБК в растении, поэтому по уровню экспрессии этого гена можно оценивать относительный уровень эндогенной АБК в растениях [3]. При холодовом стрессе количество транскрипта *RAB18* в растениях мутанта и дикого типа становится близким (рис. 2), что можно объяснить индукцией под действием холода синтеза эндогенной АБК не только в растениях дикого типа, но и у мутанта *nfz24*. При совместном действии холода и экзогенной АБК уровень экспрессии гена *RAB18* увеличивался еще значительно в равной степени у мутанта и дикого типа. Экспрессия гена *ABA1* (*LOS6*), контролирующего синтез АБК, в растениях мутанта существенно ниже (более, чем в 8 раз), чем в контрольных растениях дикого типа (рис. 2). При холодовом воздействии в растениях дикого типа экспрессия гена *ABA1* повышалась, в то время как у мутанта она оставалась на низком уровне. При совместном действии холода и АБК экспрессия гена *ABA1* в растениях дикого типа практически не изменялась по сравнению с холодной обработкой, а в растениях мутанта увеличивалась в 10 раз, достигая уровня транскрипции этого гена в растениях дикого типа после воздействия холода (рис. 2). Холодовое воздействие незначительно повышало экспрессию гена *CBF1*, кодирующего транскрипционный фактор, в растениях дикого типа и мутанта (рис. 2), но практически не влияло на уровень экспрессии гена *COR15a*, который кодирует гидрофильный белок, находящийся в строме хлоропласта (рис. 2). Таким образом, анализ транскрипции генов, контролирующих разные пути холодового ответа показал, что у мутанта *nfz24* наблюдается изменение экспрессии генов АБК-зависимого холодового ответа (*RAB18*, *ABA1*), но практически не изменена (по сравнению с диким типом) экспрессия генов не регулируемых (*CBF1*) или частично (*COR15a*) регулируемых АБК.

Измененный ответ на пониженную температуру и на яркий свет были продемонстрированы ранее для мутантов ячменя [4]. Мутант *nfz24* показал более высокий уровень устойчивости к воздействию яркого света по сравнению с растениями дикого типа. В контрольных условиях (150 мкЕ, 14 ч/с) растения дикого типа в возрасте четырех недель переходили к стадии цветения и начинали формировать цветонос, в то время как растения мутанта *nfz24* находились на стадии розетки. После воздействия ярким светом (300 мкЕ, 14 ч/с) в течение недели у растения расы *Dijon-M* прирост числа листьев и увеличение длины цветоноса не были значительным (рис. 3).

Рис. 3. Изменение морфометрических показателей (увеличение числа листьев (слева), удлинение цветоноса (справа)) растений мутанта *nfz24* (черный) и дикого типа (серый) в процентах от контроля.

В отличие от оставленных в контрольных условиях растений *nfz24*, которые так и оставались на стадии розетки, на ярком свете растения мутанта характеризовались значительным приростом числа листьев и высоты цветоноса (рис. 3). Эти результаты могут быть объяснены тем фактом, что АБК регулирует не только холодовой ответ, но также и передачу светового сигнала и ответ на изменение интенсивности освещения [5] (рис. 4).

Рис. 4. Рабочая модель ответа *A. thaliana* на холод и яркий свет [по 5].

Для изучения причины толерантности к яркому свету исследовали уровень транскрипции генов антиоксидантных систем: *sApx* (стромальной аскорбатпероксидазы), *CSD2* (магний/цинк супероксиддисмутаза) и *PrxRQ* (пероксиредуксина), поскольку эти гены участвуют в детоксикации радикалов кислорода и перекиси водорода, в том числе и при гипотермии [6, 7]. Нами установлено, что исходный уровень транскрипции гена *sApxd* в растениях мутантной линии *nfz24* ниже, чем в растениях расы *Dijon-M*, но при воздействии холодом, этот уровень значительно повышается по сравнению с диким типом (рис. 5 А).

Аналогично, но менее выражено ведет себя ген из семейства супероксиддисмутаз *CSD2* (рис. 5 А). При совместном воздействии холода и АБК уровень экспрессии гена *sApxd* в растениях расы *Dijon-M* повышается в три раза по сравнению с контрольным уровнем. Это значение у мутанта *nfz24* достигает лишь уровня в растениях дикого типа под воздействием только холода. Транскрипция гена *PrxQ* в контрольных условиях в растениях мутанта сравнима с таковой в растениях расы *Dijon-M*. Под воздействием холода, как и под совместным воздействием холода и экзогенной АБК, в растениях дикого типа экспрессия снижается. В то же время транскрипция гена *PrxQ* в растениях мутанта *nfz24* под воздействием холода не изменяется, и повышается под совместным воздействием холода и АБК. Изменение уровня транскрипции данных генов в условиях разной освещенности представлена на рис. 5 Б.

Таким образом, при воздействии холода и яркого света выявляются различия в ответе мутанта на уровне транскрипции генов по сравнению с диким типом. Следовательно, мутант *nfz24* характеризуется повышенной активностью антиоксидантных систем не только при действии гербицидов, но и при воздействии других стрессовых факторов, одной из составляющих которых является повышение уровня активированного кислорода и перекисей. В то же время эта активация недостаточна для обеспечения устойчивости мутанта к холоду.

Рис. 5. Пояснения в тексте.

Автор выражает глубокую благодарность доктору Т. Ежовой и профессору Б. Гримму за помощь в проведении исследований. Работа поддержана грантами РФФИ (проект 07-04-12077-офи), ФЦП «Ведущие научные школы» (НС-4202.2008.4).

1. Ежова Т.А., Солдатова О.П., Маманова Л.Б., Мусин С.М., Гримм В., Шестаков С.В. Коллекция мутантов *Arabidopsis thaliana* с измененной чувствительностью к индукторам окислительного стресса. Известия РАН. 2001. №56 С. 533-543.

2. Волкова Л.А., Бургутин А.Б., Солдатова О.П., Ежова Т.А., Латишин П.В. Влияние параквата и гипотермии на устойчивые к норфлуразону мутанты *Arabidopsis thaliana* и полученные из них клеточные культуры. Физиология растений. 2005, 52 (3). С. 421-429.
3. Parcy F., Giraudat J. 1997. Interactions between the ABI1 and the ectopically expressed ABI3 genes in controlling abscisic acid responses in *Arabidopsis* vegetative tissues // Plant J. Vol. 11 (4). P. 693–702.
4. Marcin Rapacz, Barbara Wolanin, Katarzyna Hura, Mirosław Tyrka 2008 The effects of cold acclimation on photosynthetic apparatus and the expression of COR14b in four genotypes of barley (*Hordeum vulgare*) contrasting in their tolerance to freezing and high-light treatment in cold conditions // Ann Bot. vol. 101 (5) pp. 689-99.
5. Chang-Hyo Goh, Hong Gil Nam, Yu Shin Park 2003 Stress memory in plants: a negative regulation of stomatal response and transient induction of rd22 gene to light in abscisic acid-entrained *Arabidopsis* plants // Plant J. vol. 36 (2) pp. 240-55.
6. Kliebenstein D.J., Monde R.A., Last R.L. Superoxide dismutase in *Arabidopsis*: An eclectic enzyme family with disparate regulation and protein localization // Plant Physiol. 1998. V. 118. P. 637-650.
7. Miller E., Schreier P. Studies on flavonol degradation by peroxidase (donor H₂O₂-oxidoreductase, EC 1.11.1.7) Part 1: kaempferol // Food Chem. 1985 V. 17. P. 143-154.

СИСТЕМНАЯ АКТИВАЦИЯ ФАГОЦИТОВ КАК ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГЕНОМА

Д.Р. Петренёв

*ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси», Гомель, Беларусь
danse@tut.by*

В последние десятилетия изучение молекулярных механизмов воздействия на организм малых доз ионизирующего излучения (ИИ) и оценка отдалённых последствий облучения стало одной из основных задач радиационной биологии. Зачастую последствия действия малых доз радиации носят стохастический характер и демонстрируют проявление немишенных или опосредованных эффектов облучения. Наибольший интерес представляют такие феномены как «нестабильность генома», «адаптивный ответ» и «эффект свидетеля» (bystander effect). Суть последнего явления заключается в том, что эффекты облучения выявляются не только в пораженных радиацией клетках, но и в соседних. Этот эффект выявляется как на клеточных культурах, так и в целостном организме [1-3]. Так сыворотка облучённых организмов при внесении в среду культивирования способна вызывать повышение количества генетических аномалий в культуре клеток, не подвергавшихся облучению, а облучение отдельных частей тела приводит к увеличению количества выявляемых генетических перестроек в клетках необлучённых тканей. Среди идентифицированных факторов, обладающих подобным эффектом, выделяют провоспалительные цитокины, свободные радикалы и некоторые продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ). Эти соединения являются кластогенными факторами и играют важную роль в индукции нестабильности генома [3, 4].

Среди отдалённых эффектов воздействия на организм ионизирующего излучения нестабильность генома остаётся наиболее загадочным феноменом. Это явление характеризуется появлением у потомков облучённых клеток неклональных мутаций и абберрантного кариотипа, т.е. повышенный уровень генетических нарушений выявляется спустя длительный срок после облучения, а выявленные нарушения не могут являться прямым следствием воздействия радиации [1, 3]. По нашему мнению одной из причин индукции нестабильности генома является усиление эндогенной продукции свободных радикалов в облучённом организме и формирование состояния называемого окислительным стрессом. Известно, что повышенный уровень продукции свободных радикалов и продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) наравне с истощением антиокислительных, детоксикационных и репарационных систем организма приводит к увеличению регистрируемого количества мутаций и хромосомных aberrаций, т.е. формированию