видимому, является следствием допущений, сделанных при обработке экспериментальных данных.

Литература

1. *Garlotta D.* A literature review of poly(lactic acid) // *J. Polym. Environ.* 2001. Vol. 9, № 2. P. 63 – 84.
2. *Круль, Л.П., Белов Д.А, Бутовская Г.В.* Структура и физико-химические свойства биodeградируемых материалов на основе полилактидов // *Вестник Белорусского государственного университета. Сер. 2, Химия. Биология. География.* 2011. № 3. С. 5 – 11.
3. *Танальский Д.В., Бойцова Н.Ю., Осипов В.А. и др.* Новое антибактериальное покрытие на основе смеси полиуретана с поли-*L*-лактидом // *Докл. Нац. акад. наук Беларуси.* 2013. Т.57, №4. С. 89 – 95.
4. *Stridsberg K.M.* Controlled Ring-Opening Polymerization: Polymers with designed Macromolecular Architecture [Text] // *Advances in Polymer Science.* 2002. Vol. 157. P. 41 – 64.
5. *Tunc I.* Synthesis, characterization, and thermal degradation of Poly (L-lactide)s // *Dissertation for the degree of Master of Sciences.* 2004. 89 p.

ГЕНЕРАЦИЯ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА И ХЛОРА НЕЙТРОФИЛАМИ КРЫС ПРИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

**К. Д. Лешкова, Е. В. Мечковская, В. Е. Тремзина, М. В. Маевская,
О. Н. Яцевич, И. Э. Адзерихо, Г. Н. Семенкова**

Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) является редким неизлечимым заболеванием, при котором происходит ремоделирование и неконтролируемая вазоконстрикция легочных сосудов, из-за чего повышается давление в системе легочной артерии и увеличивается сосудистое сопротивление. Это приводит к сердечной недостаточности и отеку легких. При ЛАГ наблюдается изменение иммунитета и в легких развивается воспалительный процесс. В пользу этого свидетельствует инфильтрация легочной ткани различными воспалительными клетками, такими как макрофаги, нейтрофилы, Т- и В-лимфоциты, увеличение циркулирующих хемокинов и цитокинов [1, 2]. Однако механизмы формирования воспаления у пациентов с ЛАГ до конца не выяснены. Следует отметить, что понимание этих механизмов необходимо для правильного выбора терапевтических мишеней для лечения ЛАГ. Известно, что при воспалении нейтрофилы гиперактивны и продуцируют избыточное количество активных кислородных метаболитов и хлорноватистой кислоты, что приводит к разрушению близлежащих клеток и тканей [3]. Цель нашего исследования: изучить закономерности генерации активных форм кислорода и хлора (АФКХ) в нейтрофилах периферической крови крыс в

норме и на разных стадиях формирования воспалительного процесса при ЛАГ.

Для создания физиологической модели ЛАГ крысам вводили монокроталин подкожно (60 мг/кг). Обследовано 10 здоровых и 40 больных ЛАГ животных на разных стадиях формирования патологии. Нейтрофилы выделяли из периферической крови крыс по стандартной методике с применением декстрана-500 и гистопака-1077 [4]. Генерацию АФКХ в нейтрофилах изучали методом хемилюминесценции (ХЛ) на биохемилюминометре БХЛ-1 (Минск, Беларусь). Определение АФКХ проводили с использованием люминола, который взаимодействует со всеми типами АФКХ. Для идентификации супероксидных анион-радикалов использовали люцигенин. «Дыхательный взрыв» в нейтрофилах индуцировали с помощью хемотаксического пептида fMLP. Вклад ферментов в процессы внутриклеточной сигнализации, которые участвуют в усиленной продукции АФКХ, оценивали с использованием специфических ингибиторов: DPI – ингибитор флавиносодержащих ферментов (НАДФН-оксидаза, NO-синтаза, дегидрогеназы электронтранспортной цепи митохондрий), АВАХ – миелопероксидазы (МПО), LY – ФИ-3-киназы, аспирин – циклооксигеназы. Секрецию МПО из нейтрофилов изучали как описано в работе [5].

Рис. 1. Суммарный выход АФКХ (А) и супероксидных анион-радикалов (Б) в нейтрофилах крови здоровых (1) и больных крыс через 14 (2), 28 (3) и 45 (4) дней после инъекции монокроталина

Из рисунка 1 видно, что суммарный выход АФКХ (А) и супероксидных анион-радикалов (Б) в нейтрофилах крови животных через 14 и 28 дней после инъекции монокроталина в несколько раз ниже, чем у здоровых крыс. Из этого следует, что у животных в ходе моделирования ЛАГ происходит нарушение кислородактивирующей функции. Снижение интенсивности ХЛ, зарегистрированной с помощью люцигенина через 14 и 28 дней после введения монокроталина, свидетельствует об

уменьшении активности АДФН-оксидазы, локализованной в плазматической мембране, поскольку по данным литературы проникновение этого индикатора ХЛ внутрь клетки затруднено. Спустя 45 дней суммарный выход АФКХ оставался на том же уровне, что и через 28 дней с момента запуска процесса развития ЛАГ, тогда как выход супероксидных анион-радикалов значительно увеличился и превысил значения, полученные для здоровых животных. Нами показано, что при формировании ЛАГ наблюдается значительное увеличение секреторной дегрануляции нейтрофилов. Это приводит к снижению количества МПО в клетках и, как следствие, к уменьшению продукции хлорноватистой кислоты в галогенирующем цикле этого фермента, что также способствует снижению суммарного выхода АФКХ.

На рисунке 2 показано влияние ингибиторов компонентов сигнальных путей на продукцию АФКХ в нейтрофилах здоровых и больных животных. Видно, что в клетках крыс с ЛАГ по сравнению со здоровыми животными снижен вклад в продукцию АФКХ МПО, ФИ-3-киназы и циклооксигеназы, тогда как участие флавиносодержащих ферментов в продукции АФКХ заметно увеличено.

Рис. 2. Влияние ингибиторов процессов внутриклеточной сигнализации на суммарный выход АФКХ в стимулированных fMLP нейтрофилах крови здоровых (1) и больных крыс через 14 (2), 28 (3) и 45 (4) дней после инъекции монокроталина

Таким образом, при экспериментальной ЛАГ у крыс (на начальных стадиях этой патологии) наблюдается уменьшение кислородаактивирующей способности нейтрофилов, стимулированных хемотаксическим пептидом fMLP, что связано с уменьшением активности НАДФН-оксидазы и увеличением секреции МПО во внеклеточную среду. На по-

следней стадии развития ЛАГ отмечается увеличение продукции супероксидных анион-радикалов, что является следствием повышения активности НАДФН-оксидазы нейтрофилов. При ЛАГ в нейтрофилах модифицируются процессы внутриклеточной сигнализации, которые вовлечены в образование АФКХ.

Литература

1. *Hassoun P.M., Mouthon L., Barberà J.A. et al.* Growth Factors, and Pulmonary Vascular Remodeling // *J. Am. Coll. Cardiol. Suppl S, Inflammation*, 2009. Vol. 54. No. 1. P. S10 – S20.
2. *Chami H., Hassoun P.M.* Immune and inflammatory mechanisms in pulmonary arterial hypertension // *Prog Cardiovasc Dis*. 2011. Vol. 55 No. 2. P. 218 – 228.
3. *Babior B. M., Lambeth J. D., Nauseef W.* The neutrophil NADPH oxidase. // *Arch. Biochem. Biophys.* 2002. Vol. 397. P. 342 – 344.
4. *Бейум А.* Выделение лимфоцитов, гранулоцитов и макрофагов // *Лимфоциты: выделение, фракционирование и характеристика*. М.: Медицина. 1980. С. 9–36.
5. *Kovalenko E.I., Semenkova G.N., Cherenkevich S.N.* Effect of hydrogen peroxide on ability of neutrophils to generate the reactive oxygen and chlorine species and secrete myeloperoxidase *in vitro* // *Tsitologiya*. 2007. Vol. 49. No 10. P. 839–847.

МОДИФИЦИРОВАНИЕ НИКЕЛЯ СЛОИСТЫМИ ОКСИДАМИ–НОСИТЕЛЯМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

А. С. Логвинович, Т. В. Свиридова

ВВЕДЕНИЕ

Оксокислоты молибдена, вольфрама и ванадия относятся к классу неорганических полимеров, способных к постепенной поликонденсации, являющейся следствием формирования ковалентных связей в процессе оляции. Скорость протекания поликонденсации чувствительна к высокоэнергетическим воздействиям и определяется целым рядом факторов, наиболее важными из которых являются температура, давление, присутствие поверхностно активных веществ и регуляторов фазообразования. Все это сказывается на положении существующего в растворе оксокислоты равновесия между олигомерными формами различной степени полимеризации и определяет склонность продуктов полимеризации оксокислоты к химической иммобилизации к поверхности твердых тел различной природы (в том числе металлов и оксидов) [1]. Последнее обстоятельство может быть использовано для создания гетерогенных катализаторов широкого спектра действия, а также модифицирования поверхности конструкционных материалов [2].