

# ДИНАМИКА ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ ОПИАТОВ В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

---

Э. П. Станько

---

*Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно*

---

С. А. Игумнов

---

*Государственный институт управления  
и социальных технологий БГУ, г. Минск  
Sigumnov67@gmail.com*

Дается динамическая оценка психопатологической симптоматики у пациентов с зависимостью от опиантов в процессе их комплексной реабилитации.

In this work the dynamic assessment of psychopathological symptomatology at patients with dependence on opiant in the course of their complex rehabilitation is given.

**К л ю ч е в ы е с л о в а:** психопатологическое состояние; ВИЧ-инфекция; опийная зависимость; ремиссия.

**К e y w o r d s:** psychopathological conditions; HIV infection; opium addiction; remission.

**Введение.** Приведены результаты клинко-психологического исследования показателей психопатологического состояния ВИЧ-позитивных (ВПН) и ВИЧ-негативных пациентов с опийной зависимостью (ВНН) до и после комплексной реабилитации, на этапах становления и стабилизации ремиссии.

В обследовании принимали участие 820 пациентов. Изучались параметры основных психопатологических симптомов с помощью опросника SCL-90-R в динамике. Представлена структура психопатологической симптоматики пациентов с опийной зависимостью. Выявлены изменения показателей психопатологического состояния исследованных пациентов до, в процессе и после комплексной реабилитации, спустя 1, 3, 6 и 12 месяцев от начала наблюдения.

Результаты исследований свидетельствуют о наличии более выраженной психопатологической симптоматики у ВПН, чем у ВНН. Установлено, что величина показателей SCL-90-R, несмотря на положительную динамику при выписке из реабилитационного центра, у исследованных пациентов существенно выше показателей здоровых лиц,

**Заключение.** Результаты исследования свидетельствуют о недостаточности кратковременной одномоментной терапии для нормализации психического состояния пациентов с опиатной зависимостью и необходимости совершенствования алгоритма ведения наркозависимых пациентов, включающего проведение длительных, корректируемых с учетом потребностей пациентов комплексных лечебно-реабилитационных программ.