**ЭЛЕКТРОГЕННАЯ АКТИВНОСТЬ И ПРОВОДИМОСТЬ
ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ КЛЕТОК *Chara gymnohylla*
ПРИ ДЕЙСТВИИ ВАНАДАТА АММОНИЯ**

Н.А. Мусаев¹, А.И. Соколик², Г. Х. Бабаева³

¹Бакинский Государственный Университет, Баку, Азербайджан

²Белорусский Государственный Университет, Минск, Беларусь

³Институт ботаники НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан

Применение ванадата, ингибитора H^+ - насосов [1, 2] могло бы дать ценную информацию о возможном взаимодействии двух компонент ион-транспортной системы плазматической мембраны растительных клеток – H^+ - насосов и K^+ - каналов. Такие исследования особенно важны для нового объекта электрофизиологических исследований – клеток пресноводных водорослей *Chara gymnohylla*, так как сведения о транспортных свойствах плазматической мембраны этих клеток немногочисленны [3-4]. В связи с этим данная работа посвящена изучению электрогенных и диффузионных свойств плазматической мембраны *Chara gymnohylla* при действии различных концентрации ванадата аммония. Целью работы является мониторинг состояния K^+ -каналов при ингибировании электрогенного транспорта, осуществляемого H^+ - насосами плазмалеммы. Показателем электрогенной активности плазматической мембраны исследуемых клеток в наших исследованиях служил мембранный потенциал φ_M , а показателем интегральной проводимости – мембранное сопротивление R_M .

Объект и методы исследования

Описание условий выращивания клеток *Chara gymnohylla* и измерения их биоэлектрических параметров даны в работах [3, 4]. Питательной средой была искусственная прудовая вода (ИПВ), содержащая (mM): KH_2PO_4 – 0,1; $CaCl_2$ – 0,4; $NaHCO_3$ – 1,0; $Mg(NO_3)_2$ – 0,1; $MgSO_4$ – 0,1; pH = 7-7,5.

Величины φ_M и R_M измеряли по двухэлектродной методике Хогга [5, 6]. При этом с помощью одного из микроэлектродов (токовый) и наружного металлического электрода (Ag – AgCl-электрод) через исследуемую клетку пропускались импульсы постоянного тока длительностью 2 -3 с, плотностью 10^{-4} А/м². φ_M и его сдвиг (электротонический потенциал) измеряли с помощью второго микроэлектрода. Мембранное сопротивление вычисляли по значениям электротонического потенциала и силе пропускаемого через клетку тока, который контролировался с помощью специального канала усиления. Измерения проводились при температуре $21 \pm 2^\circ C$.

Результаты и их обсуждение

Мембранный потенциал φ_M исследуемых нами клеток находился в пределах $-118 \div -220$ мВ со средним значением -169 ± 6 мВ. Электрическое сопротивление R_M клеток в нормальных условиях среды также варьировало в широком диапазоне- 2-7,8 Ом м², со средним значением $3,6 \pm 0,4$ Ом м² (число клеток 28). Минимальная концентрация

ингибитора, которая вызывала заметную деполяризацию плазмалеммы, составляла 5×10^{-5} М. Увеличение концентрации ингибитора в среде до 10^{-4} М приводило к деполяризации плазмалеммы на $50 \div 90$ мВ в течение $15 \div 35$ мин (рис. 1).

Рисунок 1 – Кинетика изменения мембранного потенциала φ_M клеток *Chara gymnophylla*, при действии различных концентраций (моль/л) ингибитора протонных насосов плазматической мембраны ванадата аммония. Разные кривые отвечают разным исходным уровням мембранного потенциала. Стрелками указаны моменты добавления соответствующих концентраций ингибиторов в среду

При увеличении концентрации ингибитора в среде до $3,3 \times 10^{-4}$ М (рис. 1), глубина деполяризации плазматической мембраны клеток увеличивалась еще на $15 \div 40$ мВ в течение $15 \div 20$ мин. Величина деполяризации плазмалеммы под влиянием наиболее эффективной концентрации 10^{-3} М зависела от исходного уровня φ_M и находилась в пределах $-90 - 160$ мВ. Большую величину деполяризации наблюдали для клеток с большим исходным мембранным потенциалом (рис. 1). При концентрации VO_3^- питательной среде равной 10^{-3} М мембранный потенциал φ_M клеток снижался практически до уровня потенциала клеточной оболочки (рис. 1). Деполяризующие эффекты повышенных концентраций по величине оказались одинаковыми для необработанных и предварительно обработанных малыми концентрациями ингибитора клеток. Конечные уровни мембранных потенциалов исследуемых клеток в среде с концентрацией ванадата 10^{-3} М расположились в интервале шириной 40 мВ (рис. 1).

Деполяризация плазматической мембраны под влиянием VO_3^- для 89% клеток из общей совокупности сопровождалась монотонным снижением R_M . Относительное уменьшение R_M для этих клеток под влиянием 10^{-4} М ингибитора в течение $40 \div 50$ мин

составляло 15-20 %. С ростом концентрации ингибитора в среде до $3,3 \times 10^{-4}$ М R_M клеток уменьшалось еще на 10-20 % в течение 50-60 мин. Относительное уменьшение R_M клеток под влиянием наиболее эффективной концентрации ингибитора 10^{-3} М находилось в пределах 15-50 %. Величина R_M для 11 % от общей совокупности клеток при введении в среду ванадата не изменялась. Распределение этих клеток по величине мембранного потенциала не имело каких либо отличающихся признаков от распределения ϕ_M остальных клеток.

Удаление ингибитора из раствора искусственной прудовой воды сопровождалось восстановлением величин ϕ_M и R_M исследуемых клеток. Однако ϕ_M исследуемых клеток восстанавливался, как правило, до уровней, превышающих исходный на 10-15 мВ. Наоборот, конечные уровни R_M исследуемых клеток в нормальных условиях среды после ингибиторной обработки оказались на 10-15 % ниже исходных значений. Таким образом, при отмывании клеток от ингибитора восстановление биоэлектрических параметров точно до исходных уровней не происходило. С другой стороны, эффекты ингибитора количественно зависели от его концентрации в среде (рис. 2).

Очевидно, что действие ингибитора на биоэлектрические параметры связаны с его влиянием на ионтранспортную систему плазматической мембраны исследуемых клеток. В существующей литературе мало сведений об ионтранспортной системе клеток *Chara gymnohylla*, так как они недавно внедрены в исследовательскую практику [1, 2]. Тем не менее, установленные нами данные по влиянию специфического ингибитора протонных насосов на биоэлектрические параметры клеток *Chara gymnohylla* (рис. 1) свидетельствуют о высокой чувствительности их ионтранспортной системы к внешним воздействиям. С другой стороны, деполяризация плазмалеммы клеток практически до уровня потенциала клеточной оболочки (рис. 1) свидетельствует о значительном вкладе протонных насосов в мембранный потенциал. Об этом могут свидетельствовать недавно изученные K^+ -характеристики мембранного потенциала клеток *Chara gymnohylla* [3], которые показывают, что в широком диапазоне мембранного потенциала проводимость насосов доминирует над проводимостью K^+ -каналов плазматической мембраны.

Согласно модели электрогенного транспорта «насос утечка» [7], мембранный потенциал может быть представлен следующим уравнением:

где ϕ_H , R_H и ϕ_g , R_g – величины электрического потенциала и сопротивления протонных насосов и утечки (пассивной проводимости мембраны) соответственно.

Из приведенной формулы следует, что при $R_H/R_g \ll 1$ мембранный потенциал задается, в основном, электрогенной активностью протонных насосов т.е.

Полученные нами данные полностью согласуются с этим положением модели «насос – утечка», которая может служить критерием для разграничения отдельных функциональных состояний протонных насосов растительных клеток. Весьма примечательным в этой связи является уменьшение мембранного сопротивления во время деполяризации клеток, тогда как

инактивация H^+ - насосов плазмалеммы под влиянием ингибитора должна была привести к увеличению R_M . Следовательно, установленный нами факт уменьшения R_M при действии ванадата выглядит аномальным. Однако если учесть потенциал-зависимость проводящего состояния K^+ - каналов, обнаруженный факт находит свое объяснение. Так, при рассмотрении K^+ - характеристик мембранного потенциала и сопротивления клеток *Chara gymnophylla*, было установлено, что в промежутке ϕ_M от -160 до -50 мВ, происходит потенциалзависимая активация наружу выпрямляющих K^+ - каналов [1]. Поэтому можно предположить, что уменьшения ϕ_M и R_M при действии ванадата (рис. 2) является результатом потенциалзависимой активации наружу выпрямляющих K^+ - каналов. Для тех клеток, у которых R_M не реагировало на введение в среду ванадата (11 % от общей совокупности), по-видимому, потенциалозависимая активация наружу выпрямляющих K^+ - каналов компенсируется инактивацией проводимости протонных насосов плазматической мембраны клеток.

Установленные факты свидетельствуют о тесной взаимосвязи двух основных компонент ионтранспортной системы плазматической мембраны, могут быть использованы при построении общей теории взаимодействия ксенобиотиков с биологическими мембранами. Проявленная высокая чувствительность клеток *Chara gymnophylla* к малым концентрациям

Рисунок 2 – Зависимость мембранного потенциала ϕ_M и сопротивления R_M клеток *Chara gymnophylla* от логарифма концентрации ингибитора протонных насосов плазматической мембраны – ванадата аммония

ингибитора может быть привлечена для экспресс - диагностики ионтранспортной системы растительных клеток.

Литература

1. Ларская И. А., Заботин А. И. Исследование изменения активности протонной помпы плазмалеммы при низкотемпературном закаливании проростков озимый пшеницы. // Вестник Башкирского Университета, 2001, №2, с.87-90.
2. Опритов В. А. H⁺-АТФ фаза плазматической мембраны – основная электрогенная система высших растений. // Биология 2000, т.6., № 3, с.28-32
3. Мусаев Н. А., Исмаилов Э. Р. Биоэлектрические характеристики клеток *Chara gymnohylla*. Известие НАН Азербайджана, Серия биологические науки, 2005, №3-4, с.196-214.
4. Musayev N. A., Ismailov E. R. Bioelectrical properties of *Chara gymnohylla* Plasmamembrane during interaction with cobalt (Co²⁺). // Ecology, 2007, № 63, p. 1-6.
5. Hogg J., Williams E. J., Johnston R. I. A simplified method for measuring membrane resistances *Nitella translucens*. // Biochim et Biophys. Acta, 1968, v. 150, p. 518-521.
6. Volkov G. A. General cable Theory for cells of Algae Characeae. // Biochim et Biophys. Acta, 1972., v. 255, p. 709-719.
7. Юрин В. М., Соколик А. И., Кудряшов А. П. Регуляция ионного транспорта через мембраны растительных клеток. 1981, Минск, Наука и техника, 1991, 272.

**ELECTROGENIC ACTIVITY AND CONDUCTIBILITY
PLASMA MEMBRANE *CHARA GYMNOPHYLLA* CELLS
UNDER VANADATE INFLUENCE**

N.A. Musaev¹, A.I. Sokolik², G.H. Babaeva³

¹*Baku State University, Baku, Azerbaijan.* ²*Belarusian State University, Minsk, Belarus*

³*Institute of Botany Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan*

Changes of membrane potential (ϕ_M) and resistance (R_M) of plasma membrane of *Chara gymnohylla* cells under ammonium vanadate influence were investigated.

With increase of inhibitor's concentration in the medium in range 5×10^{-5} - 10^{-3} M plasmalemma of cells was depolarized up to level of cell wall potential. Depth of depolarization varied in limits 90-160 mV. Depolarization of plasmalemma was accompanied by decreasing of membrane resistance for 89 % of cells within the limits of 15-50 %.

Effects of inhibitor is discussed from the point of view of interaction of membrane ion-transport systems, when suppression H⁺-pumps of plasma membrane is accompanied by potential-dependence activation of outside-rectified K⁺-channels.