

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра физиологии человека и животных

ПЛЮТО
Ольга Николаевна

АНАЛИЗ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ У
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Дипломная работа

Научный руководитель:
старший преподаватель,
Карман Е.К.

Допущена к защите:

«___» _____ 2017 г.

Зав. кафедрой физиологии человека и животных
д-р биол. наук, профессор Чумак А.Г.

Минск, 2017

Реферат

Дипломная работа содержит 44 страницы, 7 рисунков, 1 таблицу, 55 источников.

Ключевые слова: шейка матки, эрозия шейки матки, дисплазия шейки матки, беременность, группа крови.

Дипломная работа выполнялась на базе медицинского центра «ЛЮДЭ» г. Минск.

Объект исследования: женщины репродуктивного периода.

Цель работы: исследование частоты встречаемости заболеваний шейки матки у женщин репродуктивного возраста.

В работе были использованы методы: общеклинические, бактериологические, лабораторные, морфологические, инструментальные.

Основные результаты: установлено, что в 30% случаев при обращении в женскую консультацию выявляется патология шейки матки у женщин репродуктивного возраста. Врождённая эктопия шейки матки чаще встречается в возрасте 18 – 25 лет, а эрозия шейки матки в 26 – 35 лет. Возможно, что причиной развития данных изменений и осложнений может быть заражение ВПЧ, т.к. в 70% случаев он присутствовал у обследованных женщин. Показано, что у беременных женщин в 72% случаев выявляется патология шейки матки, при этом количество родов увеличивает вероятность возникновения эктопии в 6 раз (например, после третьих родов). В группе гинекологических больных, встречаемость патологий шейки матки уменьшилась при увеличении количества родов. Показано, что у женщин с О (I) группой крови в 2 раза чаще встречается эктопия шейки матки, а у женщин со А (II) группой крови в 2 раза чаще встречается дисплазия шейки матки.

Abstract

The thesis contains 44 pages, 7 figures, 1 table, 55 sources.

Key words: cervix, cervical erosion, cervical dysplasia, pregnancy, blood group.

The diploma work was carried out on the basis of LODE" ltd. medical multipurpose center, Minsk.

Object of the study: women of the reproductive period.

Objective: to study the incidence of cervical disease in women of reproductive age.

In the work methods were used: general clinical, bacteriological, laboratory, morphological, instrumental.

The main results: it is established that in 30% of cases when addressing to a women's consultation, the pathology of the cervix is revealed in women of reproductive age. Congenital ectopia of the cervix is more common at the age of 18 - 25 years and erosion of the cervix in 26 - 35 years. It is possible that the cause of these changes and complications may be the infection of HPV, t. In 70% of cases he was present in the examined women. It is shown that in pregnant women in 72% of cases the pathology of the cervix is detected, and the number of births increases the probability of occurrence of ectopy 6 times (for example, after third births). In the group of gynecological patients, the incidence of cervical pathologies decreased with an increase in the number of births. It was shown that in women with O (I) the blood group is 2 times more likely to have an ectopia of the cervix; while in women with A (II) the blood group is 2 times more likely to have dysplasia of the cervix.

Рэферат

Дыпломная праца ўтрымлівае 44 старонкі, 7 малюнкаў, 1 табліцу, 55 крыніц.

Ключавыя словы: шыйка маткі, эрозія шыйкі маткі, дысплазію шыйкі маткі, цяжарнасць, група крыві.

Дыпломная праца выконвалася на базе медыцынскага цэнтру «ЛОДЭ» г. Мінск.

Аб'ект даследавання: жанчыны рэпрадуктыўнага перыяду.

Мэта работы: даследаванне частаты сустрэчы захворванняў шыйкі маткі ў жанчын рэпрадуктыўнага ўзросту.

У працы былі выкарыстаныя метады: агульнаклінічныя, бактэрыялагічныя, лабараторныя, марфалагічныя, інструментальныя.

Асноўныя вынікі: ўсталявана, што ў 30% выпадкаў пры звароце ў жаночую кансультацыю выяўляецца паталогія шыйка маткі ў жанчын рэпрадуктыўнага ўзросту. Прыроджаная эктапія шыйкі маткі часцей сустракаецца ва ўзросце 18 - 25 гадоў, а эрозія шыйкі маткі ў 26 - 35 гадоў. Магчыма, што прычынай развіцця дадзеных змяненняў і ускладненняў можа быць заражэнне ВПЧ, бо ў 70% выпадкаў ён прысутнічаў ў абследаваных жанчын. Паказана, што ў цяжарных жанчын у 72% выпадкаў выяўляецца паталогія шыйкі маткі, пры гэтым колькасць родаў павялічвае верагоднасць узнікнення эктапій ў 6 разоў (напрыклад, пасля трэціх родаў). У групе гінекалагічных хворых, сустрэчы паталогій шыйкі маткі паменшылася пры павелічэнні колькасці родаў. Паказана, што ў жанчын з О (I) групай крыві ў 2 разы часцей сустракаецца эктапія шыйкі маткі, а ў жанчын са А (II) групай крыві ў 2 разы часцей сустракаюць дысплазію шыйкі маткі.