

ОБ ОБНАРУЖЕНИИ НАЯДЫ БОЛЬШОЙ (*NAJAS MAJOR* ALL.) И ХВОСТНИКА ОБЫКНОВЕННОГО (*HIPPURIS VULGARIS* L.) В ОЗЕРЕ ГЛУБЛЯ В 2010 ГОДУ
О.А. Макаревич; Т.В. Жукова

ABOUT THE DISCOVERY OF *NAJAS MAJOR* ALL. AND *HIPPURIS VULGARIS* L. IN LAKE GLUBLYA IN 2010
O.A. Makarevich, T.V. Zhukova

¹НИЛ гидроэкологии, БГУ, г. Минск, Беларусь, lakes@tut.by,

²УНЦ «Нарочанская биостанция им. Г.Г. Винберга», БГУ, Беларусь, zhukova@tut.by

В результате проведения научно-исследовательских работ на озерах ландшафтного заказника «Голубые озера» Национального Парка «Нарочанский» в 2010 г. были обнаружены редкие для территории республики Беларусь виды водных растений отдела Покрытосеменных (Цветковые) Angiospermae (Magnoliophyta): наяда большая – *Najas major* All. и хвостник обыкновенный – *Hippuris vulgaris* L.

Наяда большая – (класс Однодольные (Лилиопсиды) Monocotyledones (Liliopsida); порядок Наядоцветные Najadales; семейство Наядовые Najadaceae). Статус III категория (VU) – уязвимый вид. Согласно Красной Книге Республики Беларусь (2005 г.) включен в неё со 2-го издания (1993 г.). Распространение. Атлантическая, Средняя и Восточная (Прибалтика, северная часть России, Украина) Европа, Западная Европа, Западная Сибирь (юг), Средняя Азия. Реликтовый, по происхождению древнесредиземноморский вид, находящийся в Беларуси в отдельных локалитетах на северной границе ареала. Нами была обнаружена в заливе, образованном отмелью (юго-западная часть оз. Глубля), в северной и северо-западной его частях ближе к границе мели на глубине 2,5–4,5 м. Образует чистые и смешанные с харовыми водорослями заросли, небольшими площадками, высота растений от 10 до 40 см. Растения были извлечены кошкой и дночерпателем системы Петерсона для отбора бентосных проб, в августе.

Хвостник обыкновенный (Водяная сосенка, водяное перо, конехвостник) – класс Двудольные Dicotyledones (Magnoliopsida); порядок Хвостникоцветные (Hippuridales); семейство Хвостниковые (Hippuridaceae). Согласно Красной Книге Республики Беларусь (2005 г.) довольно редкий водно-болотный вид, требующий внимания (LC). Будучи растением, преимущественно болотным, водяная сосенка хорошо растет в неглубокой воде, но может расти также и совсем под водой. Встречается от тундры до Дальнего Востока и Средней Азии. Полностью погруженная форма хвостника обнаружена нами в западной и юго-западной частях оз. Глубля и массово в заливе, на глубине 1,0–2,0 м. Преимущественно чистые заросли, небольшими площадками, высота растений варьировала от 10 до 50 см. Растения были извлечены кошкой и дночерпателем системы Петерсона для отбора бентосных проб, в июне и августе. Воздушно водная или незначительно погруженная форма на заболоченном берегу в южной и юго-восточной частях озера среди изреженных зарослей тростника и осок. Высота стеблей не превышала 15 см. Отмечена июне и августе.

Пользуясь, случаем, выражаем благодарность сотруднику кафедры ботаники Белорусского государственного университета Джусу Максиму Анатольевичу за помощь в определении растений.