

СПЕЦИФИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

SPECIFICITY OF MORBIDITY WITH SOCIALLY SIGNIFICANT INFECTIOUS DISEASES OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS

А. В. Завадская
A. Zavadskaya

*Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ,
г. Минск, Республика Беларусь
Sinelyova@bsu.by
Belarusian State University, ISEI BSU, Minsk, Republic of Belarus*

Рассматриваются статистические данные по специфике заболеваемости социально значимыми инфекционными заболеваниями населения Республики Беларусь.

Statistical data on specificity of morbidity in socially significant infectious diseases of the population of the Republic of Belarus are considered.

Ключевые слова: социально значимые инфекционные заболевания.

Keywords: socially significant infectious diseases.

Заболевания социального характера — заболевания, характеризующиеся преимущественно социально-экономическими условиями, приносящие ущерб обществу и требующие социальной защиты человека.

Социальные болезни — болезни человека, возникновение и распространение которых в определяющей степени зависят от влияния неблагоприятных условий социально-экономического строя.

Цель работы - оценка заболеваемости социально значимыми инфекционными заболеваниями населения Республики Беларусь.

Проведен анализ данных по заболеваемости социально значимыми инфекционными заболеваниями населения Республики Беларусь [1].

На основании анализа заболеваемости социально значимыми инфекционными болезнями населения Республики Беларусь за 2005–2016 гг. были сделаны следующие выводы:

1. За анализируемый период (2005–2016 гг.) в Республике Беларусь отмечено снижение числа зарегистрированных случаев заболевания населения острыми формами вирусного гепатита, в том числе гепатита В в 2,3 раза.

2. В 2015 г. максимальное число зарегистрированных случаев заболевания населения вирусным гепатитом наблюдалось в г. Минске (8,5 случаев на 100 тыс. населения) и в Минской и Витебской обл. (4,8 и 4,1 на 100 тыс. населения соответственно).

3. В 2015 г. наибольшая заболеваемость сифилисом наблюдалась в Витебской обл. (34,8 на 100 тыс. населения), наименьшие значения зарегистрированы в г. Минске (5,5 на 100 тыс.). Максимальная заболеваемость гонококковой инфекцией наблюдалась в Витебской обл. (34,8 на 100 тыс. населения), в остальных регионах заболеваемость была на сопоставимом уровне. Хламидийные заболевания лидировали в Брестской и Могилевской обл. (111,6 и 100,0 на 100 тыс. соответственно), наименьшая заболеваемость отмечена в Гомельской обл. (38,3 на 100 тыс. населения).

4. За период с 2005 по 2015 гг. наиболее высокая заболеваемость населения Республики Беларусь вирусным гриппом и острыми инфекциями верхних дыхательных путей зарегистрирована в 2009 г. и 2011 г. (44435,2 и 41554,8 случаев на 100 тыс. населения).

5. В 2015 г. число зарегистрированных случаев заболевания населения гриппом отмечено в г. Минске (52448,6 случаев на 100 тыс. населения), что превышает среднереспубликанский показатель на 34 %. В областях заболеваемость гриппом незначительно отличалась от средней по республике.

ЛИТЕРАТУРА

1. Здравоохранение в Республике Беларусь: официальный статистический сборник за 2015 г. – Минск: ГУ РНМБ, 2016. – 271 с.