

ниями влагалища, занимают первое место в структуре гинекологической заболеваемости. Эктопия шейки матки встречается у почти 40 % женщин репродуктивного возраста [1, 2]. Нередко рецидивируя, данное заболевание шейки матки при ряде неблагоприятных условий нарушает репродуктивную и менструальную функцию у женщин, а в ряде случаев способствует возникновению рака в органе.

Цель работы – изучение особенностей эрозии шейки матки у женщин различных возрастов на примере диспансерной группы «УЗ 37 городской поликлиники» города Минска.

Проведен анализ данных статистических отчетов и амбулаторных карт больных в УЗ «37 городская поликлиника» г. Минска за 2016 г. В исследование были включены 580 женщин, которые были поставлены на учет в 2016 г. Возраст пациенток от 18 до 45 лет.

Из общего количество пациенток, состоящих на учете в гинекологическом кабинете УЗ «37 городская поликлиника», 49,5 % составляют пациентки с патологией шейки матки. Встречаемость эрозии шейки матки выше у женщин от 25 до 35 лет (68,6 % от количества женщин, состоящих на учете с эрозией), в данной возрастной группе преобладает псевдоэрозия. Наиболее частыми причинами возникновения эрозии шейки матки являются ИППП (32,4 % от всех случаев эрозии) и травмы шейки матки (30,3 %).

При лечении эрозии шейки матки наиболее эффективными являются хирургические методы лечения – 93,3 % выздоровлений. При использовании фармакотерапии – 62,1 %, физиотерапии – 47,1 % выздоровлений. Наиболее частым осложнением, возникшим в результате несвоевременного лечения эрозии шейки матки, являются ретенционные кисты шейки матки (56 % случаев) и гиперплазия эндоцервикса (18,8 %). Рак шейки матки в качестве осложнения эрозии отмечался в 5,4 % случаев.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Прилепская, В. Н.* Эктопии и эрозии шейки матки / В. Н. Прилепская, Е. Б. Рудакова, А. В. Кононов. – М.: МЕДпресс-информ, 2002. – 93 с.

2. *Русакевич, П. С.* Заболевания шейки матки: симптоматология, диагностика, лечение, профилактика / П. С. Русакевич. – Минск: Вышэйш. шк., 2000. – 368 с.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ В ПОДРОСТКОВО-ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ THE PROBLEM OF DRUG USE IN ADOLESCENCE

О. В. Климчик
O. Klimchyk

*Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ,
г. Минск, Республика Беларусь
Sinelyova@bsu.by*

Belarusian State University, ISEI BSU, Minsk, Republic of Belarus

Представлены результаты социологического исследования по изучению масштабов распространения наркотических препаратов среди молодежи г. Могилева и Могилевской области, и выяснения отношения молодых людей к проблеме потребления наркотиков.

The paper presents the results of a sociological study on the extent of the spread of narcotic drugs among young people in Mogilev and the Mogilev region, and elucidation of the attitude of young people to the problem of drug use.

Ключевые слова: наркотические вещества, проблема употребления наркотиков, злоупотребление, наркотическая зависимость, наркомания.

Keywords: drugs, problem of drugs use, drug addiction, drug abuse prevention, modern approach to prevention of drug abuse.

На сегодняшний день вопрос о злоупотреблении наркотическими средствами и психотропными веществами стоит очень остро. Отмечается дальнейшее ухудшение наркологической ситуации в Беларуси и увеличение распространения потребления ПАВ среди населения республики. Обращает на себя внимание «омоложение» выявляемых потребителей ПАВ, особенно в возрастной категории до 20 лет, а также рост распространения наркотиков среди женской популяции. Изучение особенностей распространения отдельных видов ПАВ указывает на увеличение случаев регистрации на наркологическом учете потребителей каннабиноидов, летучих жидкостей и амфетаминов. Прогноз наркологической ситуации в Беларуси и потребления основных наркотиков, указывает на дальнейшее ее ухудшение. Потребление основных наркотиков — опиума, метадона и каннабиноидов будет расти [1].

В связи с актуальностью проблемы, целью работы явилось изучение масштабов распространения наркотических препаратов в молодежной среде.

Исследование проводилось в Могилевской обл. на базе учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

Сбор социологических данных проводился с использованием анкетного опроса, данные обрабатывались с помощью статистического программного пакета для социальных наук (программы SPSS).

Результаты исследования показали, что подростки чаще всего начинают употреблять наркотики под влиянием компании и из любопытства (57 % и 58 % опрошенных соответственно). Приобретение наркотических средств не вызывает особых затруднений по утверждению 23 % респондентов, причем чаще всего наркотики предлагают друзья и знакомые. На наличие в близком социальном окружении подростков людей, употребляющие наркотики, указали 7 % респондентов. Среди опрошенных подростков 2,9 % есть постоянно употребляющие наркотики. Среди наркотиков, в употреблении которых признались респонденты, курительные смеси составляют 52 %. 18 % опрошенных не считают, что курительные смеси относятся к группе наркотических средств.

Хотя подавляющее большинство подростков (92 %) оценивают проблему наркомании как серьезную, молодые люди не обладают достаточными знаниями о пагубном воздействии курительных смесей и других наркотиков на организм человека.

ЛИТЕРАТУРА

1. Козловский, А. В. Наркологическая ситуация в Республике Беларусь: современное состояние / А. В. Козловский, А. Г. Виноцкая, В. В. Лелевич и др. // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2007. – № 1. – С. 117–120.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Г. МОГИЛЕВА ПО ПРИЧИНЕ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

ANALYSIS OF STRUCTURE OF MOGILEV POPULATION ADMISSION RATE FOR DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM

Ю. П. Ковалева^{1,2}, Ю. В. Рудков¹, Е. П. Живицкая²

Yu. Kovaleva^{1,2}, Yu. Rudkov¹, E. Zhyvitskaya²

¹Учреждения здравоохранения «Могилевская больница № 1»,
г. Могилев, Республика Беларусь

²Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ,
г. Минск, Республика Беларусь

kovaleva2014-92

¹*Healthcare Institution Mogilev Hospital №1, Mogilev, Republic of Belarus*

²*Belarusian State University, ISEI BSU, Minsk, Republic of Belarus*

Приведены данные о госпитализированной заболеваемости органов пищеварения в хирургическом отделении «Могилевской больницы № 1» за период 2012–2016 гг. Отмечается увеличение частоты госпитализации по причине острого холецистита и аппендицита, хронического панкреатита.

The data on the admission rate for the digestive system diseases in the surgical department of the healthcare institution «Mogilev hospital № 1» for the period 2012–2016 are presented. There is increase in the hospitalization rate for acute cholecystitis and appendicitis, chronic pancreatitis.

Ключевые слова: госпитализированная заболеваемость, болезни органов пищеварения, структура, динамика.

Keywords: hospitalized incidence, diseases of the digestive system, structure, dynamics.

Госпитализированная заболеваемость – это заболеваемость лиц, лечившихся в стационаре. Ее изучение позволяет определить состав госпитализированных пациентов, более точно изучить диагнозы заболеваний, частоту сопутствующих патологий и осложнений, качество врачебной диагностики, своевременность и сроки госпитализации, эффективность различных методов лечения, исходы лечения, эффективность использования коечного фонда [1].

Среди госпитализированных заболеваний немалую роль занимают заболевания органов пищеварения. Болезни органов пищеварения остаются актуальной проблемой клинической медицины во всем мире здравоохранения. Ежегодно увеличивается количество людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Медико-социальная значимость болезней органов пищеварения заключается в том, что этой