

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра физиологии человека и животных

Середич София Евгеньевна

**ОСОБЕННОСТИ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ И
СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА У
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ
СИНДРОМОМ**

Аннотация к дипломной работе

Научный руководитель: Маслова Г.Т., кандидат биологических наук, доцент

2019 г.

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 22 страницы, 7 иллюстраций, 5 таблиц, 1 приложение, 32 источника.

Ключевые слова : антифосфолипидный синдром, фето- плацентарный кровоток, свертывающая система гемостаза, беременность.

Цель работы: исследование у беременных женщин с наличием антифосфолипидного синдрома свертывающей системы крови и маточно-фето-плацентарного кровотока.

Методы исследований: аналитический анализ, статистический анализ.

В дипломной работе отражены результаты обследования 40 беременных женщин, которые находились на госпитализации в ГУ РНПЦ «Мать и дитя», из них 20 с диагнозом антифосфолипидный синдром. В исследовании был использован комплекс анамнестических, клинических, инструментальных, лабораторных и статистических методов исследования.

Оценка показателей коагулограммы проведенная на 21-30 нед. беременности у женщин с АФС выявило в отличии с нормально протекающей беременностью повышение содержания тромбоцитов и уровня Д-димеров.

Показания фето-плацентарного кровотока получены с использованием доплеровского датчика у исследуемых групп беременных женщин не отличались и соответствовали нормам.

РЭФЕРАТ

Дыпломная праца: 22 старонкі, 7 ілюстрацый, 5 табліц, 1 прыложне, 32 крывіцы.

Ключавыя словы: антыфосфаліпідны сіндром, фето-плацэтарны крывацёк, згортваючая сістэма гемастазу, цяжарнасць.

Мэта работы: даследаванне ў цяжарных жанчын з наяўнасцю антыфосфаліпіднага сіндрому згортваючай сістэмы крыві і маткава-фето-плацэтарнага крывацёку.

Метады даследаванняў: аналітычны аналіз, статыстычны аналіз.

У дыпломнай працы отабражаны вынікі абследавання 40 цяжарных жанчын, якія знаходзіліся на шпіталізацыі ў ГУ РНПЦ «Маці і дзіця», з іх 20 з дыягназам антыфосфаліпідны сіндром. У даследаванні быў выкарыстаны комплекс анамнестычных, клінічных, інструментальных, лабараторных і статыстычных метадаў даследавання.

Ацэнка паказчыкаў коагулограмы праведзеная на 21-30 нед. цяжарнасці ў жанчын з АФС выявіла ў адрозненні з звычайна працякалай цяжарнасцю падвышэнне ўтрымання трамбацытаў і ўзроўню Д-дымер.

Паказанні фето-плацэтарнага крывацёку атрыманы з выкарыстаннем доплераўскага датчыка ў доследных груп цяжарных жанчын не адрозніваліся і адпавядалі нормам.

ESSAY

Thesis: 22 pages, 7 illustrations, 5 tables, 1 appendix, 32 sources.

Key words: antiphospholipid syndrome, fetoplacental blood flow, coagulation system of hemostasis, pregnancy.

Objective: study in pregnant women with the presence of the antiphospholipid syndrome of the blood coagulation system and uterine-feto-placental blood flow.

Research methods: analytical analysis, statistical analysis.

In the thesis work, the results of a survey of 40 pregnant women who were hospitalized in the Mother and Child Center of the National Science and Industry Center "Mother and Child", of which 20 were diagnosed with antiphospholipid syndrome, are indicated. The study used a set of anamnestic, clinical, instrumental, laboratory and statistical research methods.

Evaluation of coagulation indicators held at 21-30 weeks. pregnancy in women with APS revealed, in contrast to a normal pregnancy, an increase in the platelet content and the level of D-dimers.

Indications of feto-placental blood flow obtained using the Doppler sensor in the studied groups of pregnant women did not differ and corresponded to the norms.