О МОДЕЛИРОВАНИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО БАРЬЕРА В ТЕОРИИ ШРЕДИНГЕРА С ГЕОМЕТРИЕЙ ПРОСТРАНСТВА ЛОБАЧЕВСКОГО

О.В. ВЕКО, Е.М. ОВСИЮК

In the paper a system of exact solutions for Schrödinger equation in the Lobachevsky 3-space is constructed, in a system of quasi-cartesian coordinates closely related to horospherical ones. It is shown the the problem posed in Lobachevsky space simulates a situation in the flat space for a quantum-mechanical particle in a 2-dimensional potential barrier smoothly rising to infinity on the right. Reflection coefficient for all states turns out to be equal +1

Ключевые слова: пространство Лобачевского, уравнение Шредингера, потенциальный барьер

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Известно, что при наличии у пространства–времени кривизны плоских волн в стандартном понимании для полей частиц не существует. Поэтому особый интерес вызывают примеры неевклидовых пространств, где некоторые аналоги таких решений можно построить. В работах Шапиро [1], [2] было показано, что в пространстве Лобачевского есть такие решения для частиц со спином 0. Проблема построения аналога плоских волн в пространстве постоянной положительной кривизны исследовалась Волобуевым [3]. Более поздняя трактовка вопроса о плоских волнах в пространствах постоянной кривизны дана в [4]. Недавно в [5] исследовался вопрос о построении решений уравнений Дирака в пространстве Лобачевского на основе метода квадрирования; при этом, в частности, было указано на возможность построения таким способом решений типа плоских волн из скалярных волн Шапиро. В данной работе обращаемся к случаю уравнения Шредингера в пространстве Лобачевского и строим обобщенную систему решений типа плоских волн для уравнения Шредингера в этом пространстве. Основной акцент сделан на вопросе – какую эффективную квантово-механическую ситуацию в обычном пространстве моделирует эта задача, поставленная и решенная в рамках пространства Лобачевского. Оказалось, что ситуация является точно решаемой задачей о движении частицы на фоне потенциального барьера, плавно растущего до бесконечности.

2. ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА ЛОБАЧЕВСКОГО КВАЗИДЕКАРТОВЫМИ КООРДИНАТАМИ

В пространстве–времени Лобачевского будем использовать квазидекартовы координаты

$$dS^2 = dt^2 - e^{-2z}(dx^2 + dy^2) - dz^2, \quad x, y, z \in (-\infty, +\infty);$$

элемент объема равен $dV = \sqrt{-g} dx dy dz = e^{-2z} dx dy dz$. Опишем некоторые особенности параметризации пространства координатами (x, y, z) . Напомним, что пространство Лобачевского может быть отождествлено с ветвью гиперболоида в 4-мерном псевдоевклидовом пространстве $u_0^2 - u_1^2 - u_2^2 - u_3^2 = \rho^2$, $u_0 = +\sqrt{\rho^2 + \mathbf{u}^2}$. Используемые координаты x, y, z связаны с u_a соотношениями

$$\begin{aligned} u_1 &= x e^{-z}, & u_2 &= y e^{-z}, \\ u_3 &= \frac{1}{2}[(e^z - e^{-z}) + (x^2 + y^2)e^{-z}], & u_0 &= \frac{1}{2}[(e^z + e^{-z}) + (x^2 + y^2)e^{-z}]. \end{aligned} \quad (2.1a)$$

Будем использовать 3-мерную реализацию Пуанкаре пространства Лобачевского как внутренности 3-мерной сферы:

$$q_i = \frac{u_i}{u_0} = \frac{u_i}{\sqrt{\rho^2 + u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}}, \quad q_i q_i < +1. \quad (2.1b)$$

Квазидекартовы координаты (x, y, z) связаны с q_i соотношениями:

$$x = \frac{q_1}{1 - q_3}, \quad y = \frac{q_2}{1 - q_3}, \quad e^z = \frac{\sqrt{1 - q^2}}{1 - q_3}. \quad (2.1c)$$

В частности, отмечаем, что на оси $q_1 = 0, q_2 = 0, q \in (-1, +1)$ соотношения (2.1c) дают

$$\begin{aligned} x &= 0, & y &= 0, & e^z &= \sqrt{\frac{1 + q_3}{1 - q_3}}, \\ q_3 &\longrightarrow +1, & e^z &\longrightarrow +\infty, & z &\longrightarrow +\infty; \end{aligned} \quad (2.2a)$$

$$q_3 \longrightarrow -1, \quad e^z \longrightarrow +0, \quad z \longrightarrow -\infty. \quad (2.2b)$$

3. РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ В УРАВНЕНИИ ШРЕДИНГЕРА. РЕШЕНИЯ ТИПА ПЛОСКИХ ВОЛН

В уравнении Шредингера в римановом пространстве

$$i\hbar \partial_t \Psi = \frac{1}{2M} \left[\left(\frac{i\hbar}{\sqrt{-g}} \partial_k \sqrt{-g} + eA_k \right) (-g^{kl}) (i\hbar \partial_l + eA_l) \right] \Psi \quad (3.1a)$$

в квазидекартовых координатах переменные делятся подстановкой $\Psi = e^{-iEt/\hbar} e^{ik_1 x} e^{ik_2 y} f(z)$:

$$\left[\frac{d^2}{dz^2} - 2 \frac{d}{dz} + \varepsilon - e^{2z} (k_1^2 + k_2^2) \right] f(z) = 0, \quad (3.1b)$$

где $\varepsilon = 2ME\rho^2/\hbar^2$. Элементарной подстановкой $f = e^z \varphi(z)$ уравнение (3.1a) приводится к виду уравнения Шредингера

$$\left(\frac{d^2}{dz^2} + \varepsilon - 1 - (k_1^2 + k_2^2) e^{2z} \right) \varphi(z) = 0 \quad (3.1c)$$

с потенциальной функцией $U(z) = 1 + (k_1^2 + k_2^2) e^{2z}$. Ситуация иллюстрируется рисунком 1.

Рис. Эффективная потенциальная кривая

Характерным и легко интерпретируемым физически решением при $\varepsilon > 1$ является следующее: слева имеем суперпозицию волн, падающей слева и отраженной, а справа за барьером волновая функция должна резко спадать до нуля.

Отметим специально, что случай $k_1 = 0, k_2 = 0$ является особым; при этом уравнение (3.1b) существенно меняется – в нем исчезает потенциальная функция:

$$\left(\frac{d^2}{dz^2} - 2 \frac{d}{dz} + \varepsilon \right) f(z) = 0, \quad f = e^{(1 \pm i\sqrt{\varepsilon-1}z)}, \quad \varphi = e^{(\pm i\sqrt{\varepsilon-1}z)}, \quad (3.2)$$

т. е. для функции φ возникают решения типа обычных плоских волн.

4. АНАЛИЗ ОБЩЕГО СЛУЧАЯ

Обращаемся к общему случаю. Перейдем в (3.1b) к переменной $\sqrt{k_1^2 + k_2^2} e^z = Z, Z \in (0, +\infty)$, уравнение принимает вид:

$$\left(\frac{d^2}{dZ^2} - \frac{1}{Z} \frac{d}{dZ} + \frac{\varepsilon}{Z^2} - 1 \right) f(Z) = 0; \quad (4.1)$$

выделением множителя $f = \sqrt{Z} F$ можно убрать член с первой производной

$$\left(\frac{d^2}{dZ^2} + \frac{\varepsilon - 3/4}{Z^2} - 1 \right) F(Z) = 0. \quad (4.2)$$

Это представление позволяет легко найти асимптотики решений:

$$\begin{aligned} \underline{(z \rightarrow -\infty) Z \rightarrow 0}, \quad F \sim Z^{1/2 \pm i\sqrt{\varepsilon-1}}, \quad f \sim Z^{1 \pm i\sqrt{\varepsilon-1}}, \quad \varphi \sim e^{\pm i\sqrt{\varepsilon-1}z}; \\ \underline{(z \rightarrow +\infty) Z \rightarrow +\infty}, \quad F \sim e^{\pm Z}, \quad f = \sqrt{Z} e^{\pm Z}, \quad \varphi \sim e^{-z/2} \exp\left[\pm \sqrt{k_1^2 + k_2^2} e^z\right]. \end{aligned} \quad (4.3)$$

Теперь обратимся к построению точных решений уравнения во всей области изменения координаты z . Будем искать решения в виде $f(Z) = Z^A e^{BZ} F(Z)$; уравнение (4.1) дает

$$Z \frac{d^2 F}{dZ^2} + (2A - 1 + 2BZ) \frac{dF}{dZ} + \left((B^2 - 1)Z - B(1 - 2A) + \frac{A(A - 2) + \varepsilon}{Z} \right) F = 0. \quad (4.4)$$

При A, B , выбранных согласно (далее для определенности выбираем знак минус перед корнем в выражении для A ; предполагаем $\varepsilon > 1$)

$$A = 1 - i\sqrt{\varepsilon - 1}, \quad B^2 = 1, \quad (4.5)$$

уравнение (4.4) упрощается. В полученном уравнении сделаем еще одну замену $Z = y/2$:

$$y \frac{d^2 F}{dy^2} + (2A - 1 + By) \frac{dF}{dy} + B\left(A - \frac{1}{2}\right) F = 0. \quad (4.6)$$

Уравнение (4.6) при $B = -1$ представляет собой уравнение для вырожденной гипергеометрической функции (решение уравнения (4.1) можно построить и в функциях Бесселя.)

$$y \frac{d^2 Y}{dZ^2} + (c - y) \frac{dY}{dy} - aY = 0, \quad (4.7)$$

$$c = 2a, \quad a = A - 1/2 = 1/2 - i\sqrt{\varepsilon - 1}, \quad f(Z) = y^{a+1/2} e^{-y/2} Y(y). \quad (4.8)$$

Будем использовать две пары линейно независимых решения [6]

$$\begin{aligned} Y_1 = \Phi(a, 2a, y), \quad Y_2 = y^{1-2a} \Phi(1-a, 2-2a, y), \\ Y_5 = \Psi(a, 2a, y), \quad Y_7 = e^y \Psi(a, 2a, -y). \end{aligned} \quad (4.9)$$

Эти пары решений связаны линейными соотношениями Куммера [6]

$$Y_5 = \frac{\Gamma(1-2a)}{\Gamma(1-a)} Y_1 + \frac{\Gamma(2a-1)}{\Gamma(a)} Y_2, \quad Y_7 = \frac{\Gamma(1-2a)}{\Gamma(1-a)} Y_1 - \frac{\Gamma(2a-1)}{\Gamma(a)} Y_2, \quad (4.10a)$$

которые после умножения на $y^{a+1/2} e^{-y/2}$ принимают вид:

$$f_5 = \frac{\Gamma(1-2a)}{\Gamma(1-a)} f_1 + \frac{\Gamma(2a-1)}{\Gamma(a)} f_2, \quad f_7 = \frac{\Gamma(1-2a)}{\Gamma(1-a)} f_1 - \frac{\Gamma(2a-1)}{\Gamma(a)} f_2. \quad (4.10b)$$

Обращаем внимание, что решения Y_1 и Y_2 описывают при отрицательных $z \rightarrow -\infty$ волны с асимптотическим поведением при $z \rightarrow -\infty$ ($y \rightarrow 0$)

$$\begin{aligned} f_1 = y^{a+1/2} = \left(2\sqrt{k_1^2 + k_2^2}\right)^{1-i\sqrt{\varepsilon-1}} e^z e^{-i\sqrt{\varepsilon-1}z}, \\ \varphi_1 = \left(2\sqrt{k_1^2 + k_2^2}\right)^{1-i\sqrt{\varepsilon-1}} e^{-i\sqrt{\varepsilon-1}z}; \end{aligned} \quad (4.11a)$$

$$\begin{aligned} f_2 = y^{a+1/2} y^{1-2a} = \left(2\sqrt{k_1^2 + k_2^2}\right)^{1+i\sqrt{\varepsilon-1}} e^z e^{+i\sqrt{\varepsilon-1}z} \\ \varphi_2 = \left(2\sqrt{k_1^2 + k_2^2}\right)^{1+i\sqrt{\varepsilon-1}} e^{+i\sqrt{\varepsilon-1}z}. \end{aligned} \quad (4.11b)$$

Следовательно, функция Y_5 (и связанная с ней φ_5) при отрицательных $z \rightarrow -\infty$ ведет себя как суперпозиция двух плоских волн согласно

$$\varphi_5 = \frac{\Gamma(1-2a)}{\Gamma(1-a)} \left(2\sqrt{k_1^2 + k_2^2}\right)^{1-i\sqrt{\varepsilon-1}} e^{-i\sqrt{\varepsilon-1}z} + \frac{\Gamma(2a-1)}{\Gamma(a)} \left(2\sqrt{k_1^2 + k_2^2}\right)^{1+i\sqrt{\varepsilon-1}} e^{+i\sqrt{\varepsilon-1}z}. \quad (4.12)$$

Можно определить коэффициент отражения как квадрат модуля отношения амплитуд в суперпозиции плоских волн

$$M_- e^{-i\sqrt{\varepsilon-1}z} + M_+ e^{+i\sqrt{\varepsilon-1}z}, \quad R = \left| \frac{M_-}{M_+} \right|^2, \quad R = \left| \frac{\Gamma(1-2a)}{\Gamma(2a-1)} \frac{\Gamma(a)}{\Gamma(1-a)} \right|^2. \quad (4.13a)$$

Учтем

$$\begin{aligned} 1-2a &= +2i\sqrt{\varepsilon-1}, & 2a-1 &= -2i\sqrt{\varepsilon+1}, \\ a &= 1/2 - i\sqrt{\varepsilon-1}, & 1-a &= 1/2 + i\sqrt{\varepsilon-1}, \end{aligned} \quad (4.13b)$$

тогда

$$R = \left| \frac{\Gamma(+2i\sqrt{\varepsilon-1})}{\Gamma(-2i\sqrt{\varepsilon-1})} \right|^2 \left| \frac{\Gamma(1/2 - i\sqrt{\varepsilon-1})}{\Gamma(1/2 + i\sqrt{\varepsilon-1})} \right|^2 \equiv 1. \quad (4.13c)$$

Найдем поведение Y_5 в области больших y . Применяя известное [6] асимптотическое соотношение $Y_5 = \Psi(a, c, y) \sim y^{-a}$, получим

$$\begin{aligned} z \rightarrow +\infty, \quad f_5 &= y^{a+1/2} e^{-y/2} Y_5 \sim y^{1/2} e^{-y/2} \sim \\ &\sim \left(2\sqrt{k_1^2 + k_2^2} e^z \right)^{1/2} \exp\left[-\sqrt{k_1^2 + k_2^2} e^z\right] \longrightarrow \exp^{-e^{+\infty}} = 0. \end{aligned} \quad (4.14)$$

Таким образом, решение f_5 является описанием ожидаемой ситуации: волна падает слева, отражается с вероятностью 1/2 от эффективного барьера; справа за барьером решение резко спадает до нуля. Согласно (3.1c), уравнение

$$\varepsilon - 1 = U(z) \quad \varepsilon - 1 = (k_1^2 + k_2^2) e^{2z_0}$$

определяет критическую точку z_0 , в которой поведение волновой функции должно существенно изменяться. Для точки z_0 получаем явное выражение (приводим его в обычных единицах):

$$z_0 = \rho \ln \frac{\sqrt{2ME\rho^2/\hbar^2 - 1}}{\rho \sqrt{K_1^2 + K_2^2}}. \quad (4.15)$$

Таким образом, глубина проникновения частицы определяется квантовыми числами волнового решения E , K_1 , K_2 и радиусом кривизны ρ пространства Лобачевского. При этом геометрия пространства проявляет себя как эффективная среда со свойствами идеального зеркала.

Литература

1. Шатиро И.С. // ДАН СССР. – 1956. – Т. 106. – С. 647.
2. Shapiro, I.S. Expansion of the scattering amplitude in relativistic spherical functions / I.S. Shapiro // Phys. Lett. – 1962. – Vol. 1, № 7. – P. 253–255.
3. Волобуев, И.П. Плоские волны на сфере и некоторые их применения / И.П. Волобуев // ТМФ. – Т. 45, № 3. – С. 421–426.
4. Ovsyuk, E.M. Shapiro's plane waves in spaces of constant curvature and separation of variables in real and complex coordinates / E.M. Ovsyuk, N.G. Tokarevskaya, V.M. Red'kov // NPCS. – 2009. – Vol. 12, № 1. – P. 1–15.
5. Курочкин, Ю.А. Решения уравнения Дирака в пространстве Лобачевского / Ю.А. Курочкин, В.С. Отчик // Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. фіз.-мат. навук. – 2011. – № 2. – С. 31–35.
6. Бейтмен, Г. Высшие трансцендентные функции: в 3 т. / Г. Бейтмен, А. Эрден. – 2-е изд. – Москва: Наука, 1973. – Т. 1: Гипергеометрическая функция, функции Лежандра. – 294 с.

©ГрГУ имени Я. Купалы

РАЦИОНАЛЬНЫЕ КВАДРАТУРНЫЕ ФОРМУЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ НАПЕРЕД ЗАДАННЫЙ УЗЕЛ

Е.В. ДИРВУК, К.А. СМОТРИЦКИЙ

In the main part we describe the construction of the apparatus of approximation – rational interpolating Lagrange functions on segment $[-1;1]$ with nodes sine-fraction Chebyshev-Markov in one fixed plots -1 and 1 in advance. Quadrature formulas are constructed on the basis of the Lagrange's functions

Ключевые слова: рациональные квадратурные формулы, интегрирование на отрезке