

ния данной патологии, снижения койко-дней стационарного лечения и длительности временной нетрудоспособности.

Литература

1. Белякин, С.А. Смертность от цирроза печени как индикатор уровня потребления алкоголя в популяции / С.А. Белякин, А.Н. Бобров // Вестник Российской военно-медицинской академии. – 2009. - №3. – С. 189-194.

©ГрГМУ

ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ

О.А. РЫЖЕВИЧ, И.Г. БАРЦЕВИЧ

The article describes clinical features of psoriasis in patients with disease debut in childhood or teenage. The presented data show connection of the course and severity of psoriasis and the age of the patient that need hospital treatment

Ключевые слова: экссудативный, вульгарный псориаз, индекс охвата и тяжести псориаза

1. ВВЕДЕНИЕ

Псориаз – это едва ли не самая большая проблема в дерматологии, это бесконечное страдание больного и бессилие врача, это отсутствие специфического лечения и постоянные поиски новых видов терапии, особенно востребованных при тяжелых и рефрактерных формах псориаза. Пристальный интерес врачей к этой болезни объясняется не только ростом заболеваемости псориазом в последнее время, но и увеличением частоты тяжелых, генерализованных форм этого дерматоза, которые трудно поддаются лечению, нередко приводят к инвалидизации больных [1].

2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить клинические особенности течения псориаза у госпитализированных пациентов, у которых дебют заболевания приходится на детский и подростковый возраст.

3. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

За единицу наблюдения принят каждый случай госпитализации пациентов с диагнозом вульгарный и экссудативный псориаз, у которых дебют заболевания приходился на детский и подростковый возраст. Общее число наблюдений составило 64 пациента. Источником информации послужили Карты стационарного больного, откуда производилась выкопировка предусмотренных программой исследования признаков на специальную анкету. У всех пациентов анализировали особенности клинической картины, учитывая субъективную и объективную симптоматику. Состояние кожных покровов оценивали при помощи индекса охвата и тяжести псориаза PASI. Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программы «Statistica» версия 6.2 (StatSoft).

4. РЕЗУЛЬТАТЫ

Впервые изучены основные формы псориаза, послужившие причиной госпитализации пациентов с дебютом заболевания в детском и подростковом возрасте, установлены средние показатели начала, продолжительности течения данной патологии и средний возраст пациентов, нуждающихся в госпитализации. Выявлены частота и виды сопутствующей псориазу патологии; определены сезонность, локализация и тяжесть течения данной болезни.

Литература

1. Иммунные механизмы псориаза. Новые стратегии биологической терапии / А.А. Кубанова [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. – 2010. – №1. – С. 35-47.

©БГМУ

АНАТОМИЯ УШЕК СЕРДЦА ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Д.В. РЫНДОВА, С.П. ЯРОШЕВИЧ

The object of the research was 30 heart auricles of human. The goal of the research was to define variations of heart auricles' structure of human, to work out own judgments about the function and the nature of their transformation during ontogenesis and phylogenesis through analysis of scientific literature was found individual variation of heart auricles' structure of human and difference between left and right auricle according to morphological and morphometric indicators

Ключевые слова: сердце человека, левое ухо, правое ухо, варианты строения, морфометрия

Несмотря на многочисленность фактов, посвященных морфологии сердца, не все его структуры изучены полно и всесторонне. К таким образованиям относят и ушки сердца [1]. До настоящего времени отсутствует однозначная оценка функционального значения ушек сердца. Одни исследователи на основании изменения ушек сердца в филогенезе считают их рудиментарными образованиями, дру-