

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

**Учреждение образования
«Международный государственный экологический институт имени А.Д.
Сахарова»
Белорусского государственного университета**

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

КАФЕДРА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И РАДИОБИОЛОГИИ

**АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ПОЗДНИМИ ГЕСТОЗАМИ БЕРЕМЕННЫХ
НАРОВЛЯНСКОГО РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

Дипломная работа

Специальность 1-33 01 05 Медицинская экология

Исполнитель:

студент 5 курса 43072 группы

заочной формы обучения _____ Сулейманова Вероника Станиславовна

Научный руководитель:

канд. биол. наук, доцент _____ Аблековская Оксана Николаевна

К защите допущена:

Заведующий кафедрой

экологической медицины и радиобиологии

доктор мед. наук, профессор _____ Батян Анатолий Николаевич

МИНСК 2019

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: Анализ заболеваемости поздними гестозами беременных Наровлянского района Гомельской области: 46 страниц, 3 таблицы, 21 рисунок, 49 источников.

ПОЗДНИЕ ГЕСТОЗЫ, ОТЕКИ БЕРЕМЕННЫХ, НЕФРОПАТИЯ, ПРЕЭКЛАМПСИЯ, ЭКЛАМПСИЯ

Цель работы: изучить заболеваемость поздними гестозами беременных, проживающих на территории Наровлянского района Гомельской области за период 2010-2017 гг.

Методы исследования: эпидемиологические; статистические.

Полученные результаты и их новизна: в результате работы были рассчитаны экстенсивные и интенсивные показатели, многолетние тенденции. На протяжении анализируемого временного периода было выявлено снижение числа случаев поздних гестозов и отдельных нозологических форм. При этом в структуре поздних гестозов беременных Наровлянского района за период 2010-2017 гг. первое место занимали отеки и нефропатии, далее по мере убывания шли преэклампсия и эклампсия.

Степень использования: Результаты работы могут быть использованы для прогностического анализа числа случаев поздних гестозов на ближайшие годы. Это дает возможность оценить риск возникновения данной патологии, а также провести оценку работы медико-профилактической и медико-лечебной службы Республики Беларусь за данный период.

Область применения: экология, медицина.

ABSTRACT

Graduation work: Analysis of the incidence of late gestosis in pregnant women in the Narovlya district of the Gomel region: 46 pages, 3 table, 21 figure, 49 sources.

LATE GESTOSIS, EDEMA OF PREGNANT WOMEN, NEPHROPATHY, PRE-ECLAMPSIA, ECLAMPSIA

Objective: to study the incidence of late gestosis of pregnant women living in the territory of the Narovlya district of the Gomel region for the period 2010-2017.

Research methods: epidemiological; statistical.

The results obtained and their novelty: as a result of the work extensive and intensive indicators, long-term trends were calculated. During the analyzed time period, a decrease in the number of cases of late gestosis and individual nosoological forms was revealed. Moreover, in the structure of late gestosis of pregnant women in the Narovlya district for the period 2010-2017 the first place was occupied by edema and nephropathy, then, as the decrease proceeded, preeclampsia and eclampsia occurred.

Degree of use: The results of the work can be used for a prognostic analysis of the number of cases of late gestosis in the coming years. This makes it possible to assess the risk of occurrence of this pathology, as well as to assess the work of the preventive medical and medical treatment services of the Republic of Belarus for the period.

Scope: ecology, medicine.

РЭФЕРАТ

Дыпломная праца: Аналіз захворвання познімі гестоз цяжарных Нараўлянскага раёна Гомельскай вобласці: 46 старонак, 3 табліцы, 21 малюнак, 49 крыніц.

ПОЗНІ ГЕСТОЗ, АЦЁКІ ЦЯЖАРНЫХ, НЕФРАПАТЫЯ, ПРЭЭКЛАМПСІЯ, ЭКЛАМПСІЯ

Мэта працы: вывучэнне заболеваемосати познімі гестоз цяжарных, якія пражываюць на тэрыторыі Нараўлянскага раёна Гомельскай вобласці за перыяд 2010-2017 гг.

Методы даследавання: эпідэміялагічныя; статыстычныя.

Атрыманыя вынікі і іх навізна: у выніку працы былі разлічаны экстэнсіўныя і інтэнсіўныя паказчыкі, шматгадовыя тэндэнцыі. На працягу аналізаванай часовага перыяду было выяўлена зніжэнне колькасці выпадкаў пазнейшых гестозаў і асобных нозоологіческих формаў. Пры гэтым у структуры пазнейшых гестозаў цяжарных Нараўлянскага раёна за перыяд 2010-2017 гг. першае месца займалі ацёкі і нефрапатыі, далей па меры змяншэння ішлі преэклампсія і эклампсія.

Ступень выкарыстання: Вынікі працы могуць быць выкарыстаны для прагнастычнай аналізу колькасці выпадкаў пазнейшых гестозаў на бліжэйшыя гады. Гэта дае магчымасць ацаніць рызыка ўзнікнення дадзенай паталогіі, а таксама правесці ацэнку работы медыка-прафілактычнай і медыка-лячэбнай службы Рэспублікі Беларусь за дадзены перыяд.

Вобласць ужывання: экалогія, медыцина.