Рис. 3

Литература

1. Яновская Л. А., Домбровский В. А., Хусид А. Х. Циклопропаны с функциональными группами. М.: Наука, 1980. 224 с.
2. Fedoryński M. Syntheses of *gem*-dihalocyclopropanes and their use in organic synthesis // Chem. Rev. 2003. Vol. 103, № 4. P. 1099–1132.
3. Baird M. S., Licence P., Tverezovsky V. V., Bolesov I. G., Clegg W. Enantiomerically pure 2,2-dibromocyclopropanecarboxylic acids, simple chiral building blocks // Tetrahedron. 1999. Vol. 55, № 9. P. 2773–2784.

ЭТИЛИРОВАНИЕ И ГИДРОКСИЦИКЛОПРОПАНИРОВАНИЕ ОЛЕФИНОВ В ПРИСУТСТВИИ КАТАЛИТИЧЕСКИХ КОЛИЧЕСТВ ИЗОПРОПОКСИДА ТИТАНА(IV)

Ю. Ю. Кожемякин, Ю. А. Коник, Д. Г. Кананович, В. Е. Исаков

При действии алкилмагниггалогенидов на алкоксиды титана(IV) генерируются алкоксититанацклопропановые реагенты, взаимодействие которых с ненасыщенными субстратами является удобным методом получения ряда ценных синтетических полупродуктов [1]. Разработка энантиоселективных вариантов проведения таких превращений с использованием хиральных алкоксидов титана(IV) является наиболее перспективным направлением их дальнейшего развития [2]. Для эффективной реализации этого подхода необходимо, чтобы реакции протекали каталитически, что и явилось целью настоящего исследования.

Известно, что реакция этилмагнигбромидом с аллиловыми спиртами в присутствии стехиометрических количеств изопропоксида титана(IV) приводит к продуктам формального S_N2' замещения гидроксильной

группы на этильную [3]. Наиболее гладко в это превращение вовлекаются кротиловые спирты, давая продукты с метилразветвленным углеродным скелетом, характерным для ряда биологически активных природных соединений [4].

Мы обнаружили, что проведение реакции аллильного этилирования в присутствии тетраэтоксисилана позволяет использовать каталитические количества изопропоксида титана(IV). Оптимизацию условий этого превращения осуществляли на модельном спирте *1* (рис. 1). В соответствии с полученными экспериментальными данными при каталитическом аллильном этилировании спирта *1* следует использовать 10 – 20 мольн. % изопропоксида титана(IV) и эквимольные количества тетраэтоксисилана в диэтиловом эфире или тетрагидрофуране.

Рис. 1

Выходы продуктов аллильного этилирования ненасыщенных спиртов 2–6 с различной степенью замещения кратной связи в присутствии тетраэтоксисилана приведены в таблице 1.

Таблица 1

Субстрат	Ti(Oi-Pr) ₄ , (экв.)	Растворитель	Выход продукта, (%)
 2	0.2	Et ₂ O	73
	0.2	ТГФ	54
 3	0.2	Et ₂ O	57
	0.2	ТГФ	30
 4	0.1	Et ₂ O	57
	0.1	ТГФ	60
	0.2	Et ₂ O	71
 5	0.1	Et ₂ O	78
	0.1	ТГФ	54
 6	0.1	Et ₂ O	45
	0.1	ТГФ	33

Роль добавок тетраэтоксисилана заключается в генерировании *in situ* триэтоксисилильного производного спирта 7, взаимодействие которого с алкоксититанадициклопропановым реагентом 8 приводит к ат-комплексу 9, по-видимому, не дающего в условиях реакции за счет миграции оксидно-

го остатка алилового спирта к атому титана комплексов титана с низкой реакционной способностью (рис. 2).

Рис. 2

Взаимодействие сложных эфиров с титанацклопропановыми реагентами, генерируемыми методом обмена олефинового лиганда, является удобным способом получения 1,2-дизамещенных циклопропанолов — ценных синтетических интермедиатов. Как правило, эти превращения осуществляются в присутствии стехиометрических количеств алкоксидов титана(IV).

Нам удалось подобрать условия, в которых гидроксциклопропанирование 4,4-диэтоксидбутена (10) сложными эфирами 4-хлорбутановой кислоты 11 осуществляется в присутствии каталитических количеств изопропоксида титана(IV) и приводит с хорошими выходами и высокой *цис*-диастереоселективностью к соответствующему циклопропанолу 12 (рис. 3).

Рис. 3

Установлено, что успешному осуществлению этого процесса в каталитическом варианте способствует одновременное добавление смеси исходных соединений 10, 11 и магнийорганического соединения к изопропоксиду титана(IV), проведение реакции при повышенной температуре

(в кипящем растворителе), а также использование пространственно затрудненных реактивов Гриньяра для генерирования соответствующих титанацклопропановых частиц (табл. 2).

Таблица 2

Сложный эфир	RMgX	Выход 12, (%)	Цис- / транс-12
11a	BuMgBr	54	16:1
11a	<i>i</i> -PrMgBr	65	13:1
11a	<i>c</i> -C ₅ H ₉ MgBr	44	>20:1
11б	BuMgBr	58	10:1
11б	<i>i</i> -PrMgBr	64	10:1
11б	<i>c</i> -C ₅ H ₉ MgBr	62	10:1

При гидроксициклопропанировании децена-1 (13) этил- или изопропилацетатом (14a, б), наилучшие результаты были достигнуты при использовании для генерирования титанацклопропановых частиц циклогексил- или циклопентилмагнийхлорида в ТГФ (рис. 4). При этом выходы циклопропанола 15 достигали 50-53% (табл. 3).

Рис. 4

Таблица 3

Сложный эфир	RMgX, растворитель	Выход 15, (%)
14a	<i>i</i> -PrMgBr, Et ₂ O	46
14a	<i>c</i> -C ₆ H ₁₁ MgCl, ТГФ	53
14a	<i>c</i> -C ₅ H ₉ MgCl, ТГФ	50
14б	<i>i</i> -PrMgBr, Et ₂ O	48
14б	<i>c</i> -C ₆ H ₁₁ MgCl, ТГФ	51

Таким образом, в настоящей работе найдены экспериментальные условия, позволяющие проводить реакции аллильного этилирования аллиловых спиртов и гидроксициклопропанирования олефинов с использованием каталитических количеств изопророксида титана(IV), что позволяет начать разработку энантиоселективных вариантов этих превращений.

Литература

- Кулинкович О. Г. Алкилирование производных карбоновых кислот диалкоксититанацклопропановыми реагентами // Изв. Акад. Наук. Сер. Хим. 2004. № 5. С. 1022–1043.

2. *Kulinkovich O. G., Isakov V. E., Kananovich D. G.* Stereocontrolled alkylation of unsaturated compounds with alkoxytitanacyclopropane reagents // *Chem. Record* 2008. Vol. 8. № 5. P. 269–278.
3. *Kulinkovich O. G., Epstein O. L., Isakov V. E., Khmel'nitskaya E. A.* Regioselective carbon-carbon bond formation in titanium mediated reaction of ethylmagnesium bromide with allylic alcohols and allylic ethers // *Synlett*. 2001. № 1. P. 49–52.
4. *Isakov V. E., Kulinkovich O. G.* Highly stereoselective allylic ethylation with alkoxytitanacyclopropane reagents. Synthesis of (1R/S,7R)-1,7-dimethylnonyl propanoate, the Western corn rootworm // *Tetrahedron Lett.* 2008. Vol. 49. № 49. P. 6959–6961.

**РАЗРАБОТКА ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА
КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ БУТАМИНОФЕНА
В ЛЕКАРСТВЕННОМ ПРЕПАРАТЕ
«КАПСУЛЫ ВАГИНАЛЬНЫЕ “БУТАМИНОФЕН-МИК”»**

Ю. Н. Лашкевич, И. П. Едимечева

«Бутаминофен» – эффективное противовирусное средство аминокислотной природы. Препарат используется в виде 1% и 2 % –ной мази (производство «Белмедпрепараты») для лечения вируса простого герпеса. Однако данная лекарственная форма бутаминофена существенно ограничивает терапевтические возможности лекарственной субстанции. В связи с тем, что локализация очагов поражения вирусом герпеса часто исключает применение мазевых форм препаратов (генитальный герпес), становится очевидной необходимость разработки других лекарственных форм. В качестве такой формы были предложены вагинальные капсулы «Бутаминофен-МИК».

При выборе оптимальной лекарственной формы также необходимо разработать метод анализа препарата.

Цель настоящей работы заключалась в разработке и оптимизации метода высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) для количественного определения активного вещества препарата «Бутаминофен» в лекарственной форме «Капсулы вагинальные “Бутаминофен-МИК”».

При разработке метода количественного определения за основу была принята имеющаяся методика количественного определения бутаминофена в мазевой лекарственной форме [1]. Но поскольку в новой лекарственной форме бутаминофен находится в сочетании с растительным маслом, лецитином и воском, то возникает потребность в выборе подходящей подвижной фазы, а также в разработке метода пробоподготовки.

Бутаминофен (2-гидрокси-3,5-ди-трет-бутил-N-фенилаланин) легко растворим в гексане, хлороформе, эфире и спирте, не растворим в воде. Так как бутаминофен хорошо поглощает в УФ – области спектра, то в