1. Sato M., Watanabe J., Uematsu K. // J. Sol. State Chem. 1993. Vol.107. P.460.
2. Sato M., Jin T., Uematsu K. // J. Sol. State Chem. 1993. Vol.102. P.557.
3. Portelles J., Gonzales I., Kiriev A. et al. // J. Materials Sci. Lett. 1993. Vol.12. P.1871.
4. Kim I.-T., Oh T.-S., Kim Y.-H. // J. Materials Sci. Lett. 1993. Vol.12. P.182.
5. Tanaka J., Tsukioka M., Miyazawa Y. et al. // Solid State Communications. 1980. Vol.34. P.221.
6. El-Eishereafy E., Abou Sekkina M. M. // J. Materials Sci. Lett. 1994. Vol.13. P.37.
7. Wang B., Chen S.C., Greenblatt M. // J. Sol. State Chem. 1994. Vol.108. P.184.
8. Manoharan R., Goodenough J. B. // J. Electrochem. Soc. 1990. Vol.137. №3. P.910.
9. Kharton V.V., Naumovich E.N., Vecher A.A., Nikolaev A.V. // J. Sol. State Chem. 1995. Vol.120. P.128.
10. Хартон В.В., Наумович Е.Н., Николаев А.В. и др. // Электрохимия. 1993. Т.29. Вып.10. С.1201.
11. Чеботин В.Н. Химическая диффузия в твердых телах. М., 1989.
12. Powder Diffraction Files (ASTM). Card №22-471.

Поступила в редакцию 04.08.97.

УДК 573.6.086.83:663.1

Т.И.СОКОЛЬЧИК, Г.ВЕСШАМБРЭ, П.БЭСС, В.Н.ЛЕОНТЬЕВ

ДИАСТЕРЕОСПЕЦИФИЧЕСКИЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ α -ХЛОРГИДРИНОВ

Stereochemistry of 5-chlorononanone-4 and 4-chlorooctanone-3 reduction by fungi *Mortierella isabellina* and yeast *Saccharomyces cerevisiae* was investigated. The optically pure diastereomers of corresponded α -chlorohydrines with S-configuration of carrying OH-group carbon atom was received as a result.

α -Галогенгидрины широко применяются в органическом синтезе главным образом в качестве удобных реагентов для получения через оксираны оптически активных диолов, amino-, тио-, азидоспиртов, многие из которых обладают биологической активностью и могут быть использованы для производства лекарственных препаратов, инсектицидов и др. [1]. Химические методы, за исключением восстановления α -галогенкетонов асимметрическими агентами [2], не позволяют получать хиральные α -галогенгидрины с высокой энантиомерной чистотой. Вместе с тем известно, что биохимические реакции, происходящие в живых клетках и катализируемые ферментами, отличаются высокой стереоселективностью [3]. Поэтому биотрансформация начинает успешно конкурировать с химическим синтезом. Причем изучаются как чистые ферменты [4], так и ферментные системы дрожжей [5], бактерий и грибов [6,7]. Восстановление α -галогенгидринов могут катализировать различные оксидоредуктазы, в частности в работах [4,8] описано восстановление алифатических и ароматических α -галогенкетонов лактатдегидрогеназой (КФ 1.1.1.27) и алкогольдегидрогеназой (КФ 1.1.1.1), выделенными из разных источников. Однако в литературе отсутствуют сведения о микробиологическом восстановлении 5-хлорнонанона-4 и 4-хлороктанона-3. В связи с этим представлялось целесообразным исследовать восстановление каждого из этих α -хлоркетонов несколькими различными микроорганизмами и провести сравнительный анализ стереохимии образующихся α -хлоргидринов.

Материал и методика

Были использованы штамм мицелиального гриба *Mortierella isabellina* NRRL 1757 и коммерческий препарат лиофилизированных пекарских дрожжей *Saccharomyces cerevisiae*. Штамм *M.isabellina* выращивали на среде следующего состава (г/л): 5 – дрожжевой экстракт (DIFCO), 5 – экстракт сои (ROQUETTE), 4 – глюкоза, 5 – NaCl, 5 – KH_2PO_4 , дистиллированная вода. Клетки *M.isabellina* культивировали в условиях аэрации при 27°C в течение 48 ч.

Условия биоконверсии: предварительно выращенные на питательной среде указанного состава и тщательно отмытые физиологическим раствором (0,8% NaCl) от ростовой среды клетки микроорганизма периодически культивировали при 27°C с аэрацией в течение 6, 24 и 48 ч на воде с хлоркетонем (1 г/л).

Концентрация сырой биомассы составляла 100 г/л. Затем клетки отделяли фильтрованием или центрифугированием. Супернатант экстрагировали диэтиловым эфиром в течение 24 ч, эфирную фазу высушивали $MgSO_4$, а эфир выпаривали под вакуумом.

В случае применения *S.cerevisiae* биоконверсию осуществляли с использованием 1 г лиофилизированных дрожжей на 50 мл воды.

α -Хлоркетоны (5-хлорнонанон-4 и 4-хлороктанон-3) синтезировали по методу [9] в виде рацемической смеси.

Степень конверсии α -хлоркетонов определяли методом ГЖХ с пламенно-ионизационным детектором на капиллярной колонке размером 0,32 мм x 50 м с неподвижной фазой Carbowax 20M.

Диастереомеры хлоргидринов выделяли хроматографией на силикагеле в колонке размером 1 x 100 см в системе пентан/диэтиловый эфир (95/5).

Энантиомерную чистоту каждого диастереомера рассчитывали на основании ГЖХ на капиллярной колонке размером 0,32 мм x 25 м с хиральной неподвижной фазой Lipodex E.

Конфигурацию хиральных центров устанавливали на основании анализа ПМР спектров, которые регистрировали на приборе BRUKER AC 400 с рабочей частотой 400 МГц.

Удельное вращение $[\alpha]_D^{25}$ продуктов микробиологического восстановления определяли поляриметрически (JASCO DIP 370, $\lambda=589$ нм) в хлороформе.

Результаты и их обсуждение

Выбор указанных микроорганизмов обусловлен результатами, полученными сотрудниками Лаборатории биоорганической химии химического факультета Университета г.Клермон-Феррана (Франция) в процессе изучения микробиологического восстановления различных моно- и α - и β -дикарбонильных соединений [6,10,11].

С целью определения наилучших условий образования α -хлоргидрина (1) сначала с каждым микроорганизмом проводили кинетические исследования (время инкубирования 6, 24 и 48 ч), определяя степень конверсии α -хлоркетона в хлоргидрин по данным ГЖХ.

где R = C_2H_5 или C_3H_7 , R' = C_4H_9 .

В результате время реакции биоконверсии с учетом наибольшей трансформации хлоркетона и наименьшей метаболизации образующихся хлоргидринов составляло для *S.cerevisiae* 48 ч при использовании 5-хлорнонанона-4 и 24 ч при использовании 4-хлороктанона-3, для *M.isabellina* – 6 ч при использовании обоих субстратов.

Данные ПМР спектров диастереомеров 4-хлороктанола-3 и 5-хлорнонанола-4, полученных нами путем микробиологического восстановления соответствующих α -хлоркетонов и выделенных с помощью жидкостной колоночной хроматографии, представлены в табл.1.

Как видно, *син*-изомеры имеют меньшие химические сдвиги протонов у атомов углерода хлоргидринного фрагмента молекулы, что согласуется с данными литературы [12].

В табл.2 представлены количественные исследования по стереохимии микробиологического восстановления алифатических α -хлоркетонов.

Из имеющихся в литературе сведений [13], данных табл.1 и сравнения знака удельного вращения диастереомеров хлоргидринов следует, что *син*-изомеры конфигурации (S,S) имеют отрицательное удельное вращение, *анти*-изомеры конфигурации (S,R) – положительное удельное вращение при условии восстановления каждого субстрата одним и тем же микроорганизмом.

Таблица 1

**Данные ПМР спектров α -хлоргидринов,
полученных микробиологическим восстановлением**

Структура α -хлоргидрина	Диастереомеры	Спектральные характеристики δ , м.д. (CDCl ₃) (мультиплетность, интегральная интенсивность)
<i>син</i> -	0,90 (т, J=7 Гц, 3H); 0,95 (т, J=7 Гц, 3H); 1,25-1,65 (м, 3x2H); 1,75-1,80 (м, 2H); 2,38 (с, 1H); 3,50-3,55 (м, 1H); 3,86-3,92 (м, 1H)
	<i>анти</i> -	0,90 (т, J=7 Гц, 3H); 1,00 (т, J=7 Гц, 3H); 1,30-1,70 (м, 3x2H); 1,70-1,80 (м, 2H); 3,62-3,70 (м, 1H); 3,98-4,05 (м, 1H)
<i>син</i> -	0,85-0,95 (м, 2x3H); 1,25-1,40 (м, 4x2H); 1,80-1,95 (м, 2H); 3,55-3,60 (м, 1H); 3,85-3,92 (м, 1H)
	<i>анти</i> -	0,85-1,00 (м, 2x3H); 1,30-1,85 (м, 5x2H); 3,70-3,80 (м, 1H); 4,00-4,05 (м, 1H)

Примечание: с – синглет, т – триплет, м – мультиплет.

Таблица 2

Сравнительные данные стереохимии микробиологического восстановления

Микроорганизмы	Полученные хлоргидрины	Общий выход, %	Диастереомеры	Соотношение изомеров, %	$[\alpha]_D^{25}$	Энантиомерный избыток е.е. %	Абсолютная конфигурация
S.cerevisiae		15,0	<i>син</i> -	58	-35	98	4S,5S
			<i>анти</i> -	42	+8	98	4S,5R
	13,0	<i>син</i> -	70	-28	95	3S,4S
			<i>анти</i> -	30	+17	95	3S,4R
M.isabellina		5,0	<i>син</i> -	90	-9	30	4S,5S
			<i>анти</i> -	10	-	-	-
	15,0	<i>син</i> -	50	-17	87	3S,4S
<i>анти</i> -			50	+14	94	3S,4R	
S.cerevisiae		61,0	<i>син</i> -	89	-33	98	2S,3S
			<i>анти</i> -	11	+27	98	2S,3R

Примечание: * – данные взяты из [13].

Абсолютная конфигурация полученных нами хлоргидринов была установлена на основании сравнения с конфигурацией родственных соединений, образующихся при помощи одного и того же микроорганизма (*S.cerevisiae*) [13], в соответствии с правилом Кана–Ингольда–Прелога.

Все полученные нами диастереомеры хлоргидринов имеют S-конфигурацию атома углерода, связанного с гидроксильной группой, хотя известна возможность образования хлоргидринов с R-конфигурацией данного атома углерода [14].

Низкие выходы полученных диастереомеров, в особенности в случае использования *M.isabellina*, на наш взгляд, можно объяснить достаточно высокой скоростью их метаболизации. Причем для *M.isabellina* наблюдается также и низкая энантиоселективность.

Таким образом, независимо от конфигурации атома углерода, несущего хлор, восстановление карбонильной группы у обоих исходных α -хлоркетонов происходит стереоселективно, причем оба микроорганизма образуют хлоргидрины с S-конфигурацией атома углерода, связанного с гидроксильной группой. Такое направление восстановления является, вероятно, специфическим свойством ферментных систем выбранных микроорганизмов.

1. Bartlett P. A. *Asymmetric Synthesis* / Ed. by J.D.Morrison. New York, 1984. Vol.3. P.411.
2. Itsuno S., Ito K., Hirao A., Nakahama S. // *J.Chem.Soc., Chem.Commun.*, 1983. P.469.
3. Grout D. H. C. *World Biotechnology Report, Proceeding of Biotechnology'86*. London, 1986. P.13..
4. Hirschbein B. L., Whitesides G. M. // *J.Am.Chem.Soc.* 1982. Vol.104. P.4458.
5. Servi S. // *Synthesis*. 1990. P.1.
6. Belan A., Bolte J., Fauve A. et al. // *J.Org.Chem.* 1987. Vol.52. P.256.
7. Nakamura K., Kawai Y., Kitayama T. et al. // *Bull.Inst.Chem.Res.* 1989. Vol.67. P.157.
8. Tanner D. D., Stein A. R. // *J.Org.Chem.* 1988. Vol.53. P.1642.
9. Hooz J., Bridson J. N. // *Canad.J.Chem.* 1972. Vol.50. P.2387.
10. Bel-Rhlid R., Fauve A., Renard M., Veschambre H. // *Biocatalysis*. 1992. Vol.6. P.319.
11. Fauve A., Veschambre H. // *Biocatalysis*. 1990. Vol.3. P.95.
12. Besse P. These Universite Blaise Pascal. Clermont-Ferrand, 1993. №556.P.299.
13. Utaoka M., Kohishi S., Takeda A. // *Tetrahedron Lett.* 1986. Vol.27. P.4737.
14. Carvalho M., Okamoto M. T. // *Tetrahedron*. 1991. Vol.47. P.2073.

Поступила в редакцию 01.07.97.