

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра генетики

ГОРОХОВИК
Инна Сергеевна

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЯ
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ ПРИ НОРМАЛЬНОМ СЛУХЕ И
СОХРАННОЙ ИННЕРВАЦИИ РЕЧЕВОГО АППАРАТА –
ДИСЛАЛИИ У СИБСОВ

Аннотация
к дипломная работа

Научный руководитель:
кандидат биологических наук,
доцент А.В. Лагодич

Минск, 2020

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 66 страницы, 18 рисунков, 4 таблицы, 29 источников.

Ключевые слова: дислалия, функциональная дислалия, механическая дислалия, укороченная подъязычная связка, прогнатия, готическое нёбо, речевая карта.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ ПРИ НОРМАЛЬНОМ СЛУХЕ И СОХРАННОЙ ИНЕРВАЦИИ РЕЧЕВОГО АППАРАТА – ДИСЛАЛИИ У СИБСОВ

Цель работы: определение природы факторов влияющих на особенности проявления нарушения звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого аппарата - дислалии у сибсов.

Объект исследования: речевые карты детей - дислаликов

Методы: методика для исследования строения артикуляционного аппарата, методики исследования психических процессов, методики для обследования: состояния импрессивной речи, звукопроизношения, состояние дыхательной и голосовой функций, слоговой структуры слова, просодической стороны речи, фонематического слуха и фонематического восприятия, состояния экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи и связной речи.

Полученные результаты: Основные причины возникновения функциональной дислалии у анализируемой выборки: педагогическая запущенность, недоразвитие фонематического слуха, двуязычие в семье, усвоение ребенком неправильных образцов речи взрослых.

Основные причины возникновения механической дислалии у сибсов: дефекты зубочелюстной системы (прогнатия) – 50%, дефекты строения языка (укороченная подъязычная связка) – 36% и в строении твердого нёба (узкое, слишком высокое («готическое») нёбо) – 14%. Частота распространенности функциональной и механической дислалии среди сибсов составляет 59% и 41% соответственно.

РЭФЕРАТ

Дыпломная праца: 66 старонак, 18 малюнкаў, 4 табліцы, 29 крыніц.

Ключавыя словы: дыслалія, функцыянальная дыслалія, механічная дыслалія, скарочаная пад'язычная звязка, прагнатыя, гатычнае нёба, моўная карта.

АСАБЛІВАСЦІ ПРАЯУЛЕННЯ ПАРУШЭННЯГУКАВЫМАЎЛЕННЯ ПРЫ НАРМАЛЬНЫМ СЛЫХУ І ЗАХАВАНАЙ ІНЕРВАЦЫІ МАЎЛЕНЧАГА АПАРАТА-ДЫСЛАЛІІ СІБСАЎ

Мэта працы: вызначэнне прыроды фактараў, якія ўплываюць на асаблівасці праявы парушэнні гукавымаўлення пры нармальным слыху і захаванай інэрвацыі маўленчага апарата - дыслалііу сібсаў.

Аб'ект даследавання: маўленчыя карты дзяцей-дыслалікаў

Метады: метадыка для даследавання будовы артыкуляцыйнага апарата, метадыкі даследавання псіхічных працэсаў, метадыкі для абследавання: стану імпрэсіўнага маўлення, гукавымаўлення, стану дыхальнай і галасавой функцый, складовай структуры слова, прасадычнага боку маўлення, фанематычнага слыху і фанематычнага ўспрымання, стану экспрэсіўнага маўлення, стана граматычнага ладу маўлення і сувязнага маўлення.

Атрыманыя вынікі: Асноўныя прычыны ўзнікнення функцыянальнай дыслалііў аналізаванай выбаркі: педагагічная запушчанасць, недаразвіццё фанематычнага слыху, двухмоўе ў сям'і, засваенне дзіцем няправільных узораў маўлення дарослых.

Асноўныя прычыны ўзнікнення механічнай дыслаліі у сібсаў: дэфекты ў зубасквічнай сістэмы (прагнатыя) – 50%, дэфекты будовы языка (скарочаная пад'язычная звязка) – 36% і ў будове цвердага нёба (вузкае, занадта высокае («гатычнае») нёба) – 14%. Частата распаўсюджанасці функцыянальнай і механічнай дыслаліі сярод сібсаў складае 59% і 41% адпаведна.

REFERAT

Bericht: 66 Seiten, 18 Abbildungen, 4 Tabellen, 29 Quellen.

Schlüsselwörter: Legasthenie, funktionelle Legasthenie, mechanische Legasthenie, verkürztesublinguale Ligamentum, Vorhersage, gotischen Himmel, Sprachkarte.

EIGENSCHAFTEN DER MANIFESTATION DER STÖRUNG DES TONKLANGES BEI NORMALEM HÖREN UND ERHALTENER INNERVATION DES SPRACHGERÄTS - DYSALIA IN SIBS

Das Ziel der Arbeit ist: Bestimmung der Faktoren, die die Natur Merkmale der Symptome Störungen des sprechklanges bei normalem Gehör und intakten Innervation des sprechapparates - дислалии bei sibсов.

Forschungsobjekt: Sprachkarten von legasthenikerkindern

Methoden: Methoden zur Untersuchung der Struktur des artikulationsapparates, Methoden zur Untersuchung psychischer Prozesse, Methoden zur Untersuchung: Zustand der impressiven Sprache, Ton, Zustand der Atem-und Sprachfunktionen, silbenstruktur des Wortes, prosodische Seite der Rede, phonematisches hören und phonematische Wahrnehmung, Zustand der expressiven Sprache, Zustand der grammatischen Struktur der Rede und der zusammenhängenden Sprache.

Ergebnisse: die Wichtigsten Ursachen für die funktionelle Legasthenie in der analysierten Probe: pädagogische Vernachlässigung, Unterentwicklung des phonemischen Hörens, Zweisprachigkeit in der Familie, Assimilation von falschen Sprachproben von Erwachsenen durch das Kind.

Die wichtigsten Ursachen für die mechanische Legasthenie bei sibbs: defekte in der zahn-Kiefer-System (prognathie) – 50%, defekte in der Struktur der Zunge (verkürzte sublinguale Ligamentum) – 36% und in der Struktur des festen Himmels (schmal, zu hoch («gotischen») Himmel) – 14%. Die Häufigkeit der Prävalenz der funktionellen und mechanischen Legasthenie unter den sibbs beträgt 59% bzw. 41%.