Математика и механика

УДК 681.322.06.519.86

К. А. ЗУБОВИЧ, А. Н. МЕЛЕШКО

ОБ АВТОМАТИЧЕСКОМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ ПРАВИЛЬНОСТИ ПРОГРАММ В СИСТЕМЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

В последнее время много внимания уделяется проблемам функционального (аппликативного) программирования. Одно из наиболее обсуждаемых направлений этого подхода к программированию — *FP*-функциональный стиль написания программ [1]. Наряду с такими свойствами, как наглядность, прозрачность, компактность программ, *FP*-системы характеризуются простотой верификации создаваемого программного обеспечения. Однако сам процесс верификации, будучи простым и требующим лишь выполнения механических преобразований, отличается громоздкостью математических выкладок и необходимостью постоянно держать в уме теоремы и законы алгебры программ (особенно при доказательстве правильности нетривиальных программ). Это приводит к увеличению времени верификации и появлению ошибок, что, в свою очередь, ставит вопрос о создании инструментальной системы поддержки доказательства. В данной статье предлагаются основанные на схематизации процесс и система автоматизации доказательства правильности *FP*-функциональных программ, написанных в рамках реализованной системы функционального программирования *SFP* [2], которая, за исключением незначительных деталей, является аналогом *FP*-системы Бэкуса [1].

Определение 1. Назовем базисом β множество, представляющее собой объединение следующих множеств: 1) множества X функциональных символов: $X = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$; 2) множества S специальных символов: $S = \{=, ;, (,)\}$; 3) множества L латинских букв для обозначения функций языка; 4) множества C символов функциональных форм: $C = \{\langle o \rangle, \langle [\dots] \rangle, \langle \dots \rightarrow \dots ; \dots \rangle\}$; 5) множества термов (функциональных выражений), которое определяется рекурсивно; E есть терм относительно переменных $X_1, X_2, \dots, X_n$, если имеет место только одно из следующих предложений: а) $E(X_1, \dots, X_n) = B \in L$; б) $E(X_1, \dots, X_n) = X_i \in X$; в) существуют термы $E_1, E_2, \dots, E_k$ и функциональная форма γ с k параметрами, построенная посредством композиции функциональных форм из множества C , такая, что $E(X_1, \dots, X_n) = \gamma(E_1, \dots, E_k)$.

Определение 2. Пусть задан базис β . Функциональным *SFP*-уравнением назовем выражение e_i вида: (I) $X_i = E_i(X_1, \dots, X_n)$, где $E_i(X_1, \dots, X_n)$ — терм, X_i — функциональная переменная.

Определение 3. Функциональной *SFP*-схемой называется последовательность (система) функциональных уравнений $(e_1, e_2, \dots, e_m)$ (I'') такая, что все X_i в левых частях различны и любой неопределенный ранее символ X_j , встречающийся в правой части некоторого уравнения, входит в левую часть этого или другого уравнения.

Введем понятие интерпретации базиса β в области интерпретации D — множестве последовательностей-кортежей $\langle d_1, \dots, d_n \rangle$, т. е. $D = (D_1^+)^n$, где D_1 — произвольное множество, $D_1^+ = D_1 \cup \omega$, $(D_1^+)^n = D_1^+ \times D_1^+ \times \dots \times D_1^+$, ω — специальный элемент для представления величины «не определено», который служит для достижения всюду определенности функций, получаемых в результате интерпретации схем.

Определение 4. Интерпретацией базиса β в области интерпретации D называется функция I , которая сопоставляет: 1) каждому X_i — всюду определенную функцию $f_i = I(X_i): D \rightarrow D$; 2) каждому $x \in L$ — некоторую всюду определенную функцию $f = I(x): D \rightarrow D$, построенную по правилам *SFP*-языка; 3) каждому символу $c \in C$ — некоторую всюду определенную функцию $G = I(c): F \rightarrow F$, где F — множество допустимых *SFP*-функций, причем символы функциональных форм интерпретируются следующим образом. Если E_1, E_2, E_3 — термы, а g_1, g_2, g_3 — функции, полученные в результате интерпретации E_1, E_2, E_3 соответственно, то интерпретация терма $(E_1 \circ E_2)$ определяется так: $(g_1 \circ g_2): d \equiv g_1: (g_2: d)$; терм вида $[E_1, E_2]$ интерпретируется как результат применения функций g_1 и g_2 к $d \in D$ с получением кортежа $\langle g_1: d, g_2: d \rangle$; а форма $E_1 \rightarrow E_2; E_3$ при ее интерпретации определяет функцию вида: для любого $d \in D$, если $g_1: d = T$, то $g_2: d$; иначе $g_3: d$, где символ T используется для обозначения логического значения «истина».

На множестве D по аналогии с [3] введем частичный порядок $\sqsubseteq$ следующим образом: для любого $d \in D_1^+$ справедливо $\omega \sqsubseteq d$ и $d \sqsubseteq d$, а для $(D_1^+)^n$ имеет место $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \sqsubseteq \langle b_1, \dots, b_n \rangle$ тогда и только тогда, когда для каждого i , $1 \leq i \leq n$, $a_i \sqsubseteq b_i$. Далее, следуя [3] и вводя понятия монотонности и непрерывности функций над D и термов над F , можно показать, что каждый терм $E(X_1, \dots, X_n)$, построенный в базисе β , является непрерывным относительно любой из переменных. Согласно теореме о наименьшей неподвижной точке [3], *SFP*-схема (I'') всегда имеет наименьшее решение вида $\langle f_{1\min}, \dots, f_{m\min} \rangle$. Эффективная процедура его построения подобна методу исключения неизвестных решения систем линейных алгебраических уравнений и использует результаты, аналогичные полученным в теории линейных форм [4]. Для замкнутости изложения сформулируем основные из них.

Теорема 1. Уравнение вида $X_i = p \rightarrow g; E_i(X_1, \dots, X_i, \dots, X_n)$ в случае линейности терма E относительно X_i (уравнение будем называть линейным) имеет наименьшее решение, представимое в виде условия: $X_{i\min} = p \rightarrow g; E_i(X_1, \dots, p, \dots, X_n) \rightarrow E(X_1, \dots, g, \dots, X_n); \dots; E_i^n(X_1, \dots, p, \dots, X_n) \rightarrow E^n(X_1, \dots, g, \dots, X_n); \dots$, где E_t — так называемый преобразователь предиката.

Определение 5. Терм $E_i(X_1, \dots, X_i, \dots, X_n)$ называется линейным относительно переменной X_i , если существует терм $E_{t_i}(X_1, \dots, X_i, \dots, X_n)$, называемый преобразователем предиката, такой, что имеет место следующее:

- 1) Для любых функций a, b, c $E_i(X_1, \dots, a \rightarrow b; c, \dots, X_n) = E_{t_i}(X_1, \dots, a, \dots, X_n) \rightarrow E(X_1, \dots, b, \dots, X_n); E(X_1, \dots, c, \dots, X_n)$.
- 2) Для любого объекта $d \in D$, если $E_{t_i}(X_1, \dots, \omega, \dots, X_n) \neq \omega$, то для любой функции a $E_{t_i}(X_1, \dots, a, \dots, X_n): d = T$.

Теорема 2. Любой терм, построенный в базисе β , линейный, если переменные X_i встречаются в нем только один раз.

Теорема 3. Любая функция, построенная в *SFP*-системе [2], может быть представлена посредством композиции функциональных форм базиса β и рекурсивных определений.

Сформулированные выше определения и теоремы являются математической основой процесса и системы верификации достаточно большого класса *SFP*-программ, где под верификацией понимается установление

формальными методами соответствия исследуемой программы своим спецификациям.

Процесс верификации функциональных *SFP*-программ предполагает выполнение следующей последовательности действий: 1) схематизацию исходной программы; 2) исключение свободных переменных; 3) линеаризацию уравнений полученной системы; 4) разложение линейных уравнений и построение наименьшего решения; 5) интерпретацию полученного наименьшего решения функциями исходной программы; 6) символическое выполнение построенного и проинтерпретированного минимального решения.

При схематизации определяемые функции заменяются символами множества X , функции, ранее определенные и базисные, — символами множества L , а функциональные формы, используемые в *SFP*-системе, следуя теореме 3, заменяются рекурсивными определениями, построенными из форм базиса β . Исключение свободных переменных состоит в удалении уравнений вида $X_i = A$, $A \in L$, и замене всех вхождений в правую часть уравнений таких X_i на символы множества L . Под линеаризацией понимается приведение *SFP*-схемы к линейному виду. Разложение линейных уравнений с построением наименьшего решения осуществляется, согласно теореме 1. Интерпретация решения предполагает обратную замену его символов функциями исходной программы. Под символическим выполнением понимается такое выполнение, когда исходная информация для анализируемого решения и результат представляются не в виде конкретных данных, а в виде их символьных обозначений. На основании полученных выходных можно судить о правильности исходной программы.

Описанный подход к схематизации *SFP*-программ и процесс верификации являются теоретической основой подсистемы автоматизированного доказательства правильности программ. В состав подсистемы входят: анализатор, схематизатор, линеаризатор, минимизатор, интерпретатор, исполнитель. Задача анализатора — проверить правильность записи *SFP*-программ. Результат его работы представляет собой либо перечень ошибок, либо (если ошибок не обнаружено) программу, преобразованную к виду, удобному для схематизации. Смысл работы схематизатора состоит в преобразовании исходной программы в *SFP*-схему. Побочным результатом работы схематизатора является таблица соответствия символов и функций. Основным блоком системы (как с точки зрения выполняемых функций, так и с точки зрения их сложности) служит линеаризатор, осуществляющий свертку *SFP*-схемы и линеаризацию уравнений. Для этого организован ряд библиотек и таблиц, наиболее важные из них: библиотека целей линеаризации, библиотека трансформаций *SFP*-схем, таблица линейных термов и их преобразователей предиката. Один из принципов работы линеаризатора — постоянное, в процессе проведения доказательств, пополнение указанных библиотек. Библиотека целей линеаризации наряду с шаблонами схем содержит ссылки на способ построения решения. Минимизатор, используя эту библиотеку и полученные ранее преобразователи предикатов, осуществляет построение модели минимального решения. Замена символов функциями исходной программы в минимальном решении осуществляется интерпретатором в соответствии с таблицей замен. После этого исполнитель выполняет действия, необходимые для вычисления функции, полученной интерпретатором. Пользователю системы необходимо лишь сравнить полученную в результате символического выполнения цепочку с ожидаемой и сделать заключение о правильности исходной программы.

Реализована первая версия описанной системы. Реализация осуществлена по *CP*-технологии с использованием языка *CP/TRAN* [5], причем свойства *CP*-технологии и языка *CP/TRAN* позволили сократить время создания комплекса. Сокращению времени способствовал и тот факт, что реализация одной из версий системы *SFP* [2] также осуществлена на языке *CP/TRAN*. Это позволило, взяв за основу описание структуры

SFP-системы и изменив лишь семантические действия, определяющие алгоритмы преобразования входной информации, просто и быстро построить такие подсистемы, как анализатор, схематизатор и линеаризатор. Средства работы с рекурсивными функциями языка СР/ТРАН также упростили процесс реализации системы.

Список литературы

1. В а с к у с J.// Communications of the ACM. 1978. V. 21. № 8. P. 613.
2. З у б о в и ч К. А.// Проблемы создания и совершенствования технических и программных средств э. в. м. широкого применения. Минск. 1982. С. 54.
3. М а н н а З.// Кибернетический сб. Новая серия. М. 1978. Вып. 15. С. 38.
4. В а с к у с J.// Lecture Notes in Computer Science. 1981. V. 107. P. 1.
5. Д р о б у ш е в и ч Г. А., Т о Т у а н, З у б о в и ч К. А.// Программирование. 1984. № 3. С. 84.

Поступила в редакцию 11.09.85.

УДК 517.938

Б. С. КАЛИТИН

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КОМПАКТНЫХ МНОЖЕСТВ

1. Пусть $(X, \mathbf{R}, \pi)$ — динамическая система [1, 2], заданная на локально компактном метрическом пространстве (X, d) с расстоянием $d: X \times X \rightarrow \mathbf{R}$. Пусть M и Y — два положительно инвариантных подмножества X , из которых M компактно, а Y замкнуто и содержит M . Положим $B(M, \varepsilon) = \{x \in X | d(M, x) < \varepsilon\}$; $\bar{B}(M, \varepsilon)$ — замыкание $B(M, \varepsilon)$ и $S(M, \varepsilon) = \bar{B}(M, \varepsilon) \setminus B(M, \varepsilon)$. Обозначим через $\gamma^+(x)$, $\gamma^-(x)$ и $\gamma(x)$ соответственно положительную полутраекторию, отрицательную полутраекторию и траекторию движения xt , $x: t \mapsto xt$, $\forall x \in X$, и пусть $L^+(x)$ означает множество всех ω -, а $L^-(x)$ — множество всех α -предельных точек для $x \in X$. Напомним (см. [1, 2]), что множество N из X называют положительно инвариантным, отрицательно инвариантным или инвариантным, если соответственно выполняются равенства: $N\mathbf{R}_+ = N$, $N\mathbf{R}_- = N$ или $N\mathbf{R} = N$. Кроме того, M называется [2]:

(а)-устойчивым относительно Y , если

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0) : \gamma^+(B(M, \delta) \cap Y) \subset B(M, \varepsilon);$$

(б)-асимптотически устойчивым относительно Y , если оно устойчиво относительно Y и область его притяжения $A_Y(M) = \{x \in Y | L^+(x) \subset M\}$ является окрестностью M в Y ;

(в)-глобально асимптотически устойчивым относительно Y , если оно асимптотически устойчиво относительно Y и $A_Y(M) = Y$. (В современной литературе устойчивость относительно Y иногда называют Y -устойчивостью.)

2. Приведем теперь ряд утверждений, касающихся качественной теории проблем относительной устойчивости компактных множеств. Соответствующие этому результаты являются продолжением исследований устойчивости компактных множеств, выполненных в [1, 3, 4].

Лемма 1. Если M устойчиво относительно Y , то $\forall \gamma(x) \subset Y$ — пересечение $L^-(x) \cap M = \emptyset$. (Здесь и всюду в дальнейшем $\emptyset$ — пустое множество.)

Лемма 2. Если M неустойчиво относительно Y , то всякая окрестность U множества M в Y обладает тем свойством, что $U \setminus M$ содержит отрицательную полутраекторию. Более точно, существует компактная окрестность $\bar{B}(M, \varepsilon)$, $\varepsilon > 0$, для которой $\forall \varepsilon_1 \in]0, \varepsilon]$ существуют последовательности (x_n) , $x_n \in Y$, и (t_n) , $t_n \geq 0$, такие, что $x_n \rightarrow x \in M$, $x_n t_n \rightarrow y \in S(M, \varepsilon) \cap Y$ при $n \rightarrow +\infty$, причем $\gamma^-(y) \subset (\bar{B}(M, \varepsilon_1) \setminus M) \cap Y$.

Доказательство. Пусть M не является Y -устойчивым. Тогда