

ДИСТАЛЬНЫЕ АМПУТАЦИИ СТОПЫ ПРИ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

С. Г. ОМЕЛЬЧЕНКО, А.М. ПОБЫЛЕЦ, А. Г. КУЗНЕЦОВ

The study describes several methods of the diabetes mellitus complications treatment. Especially the attention is paid on different types of amputations that are performed in patients with diabetes

Ключевые слова: дистальная ампутация, артериальная недостаточность

1. ВВЕДЕНИЕ

Лечение больных с гнойно-некротическими поражениями стопы, возникшими вследствие ХАННК атеросклеротического и диабетического генеза, остается трудной задачей современной хирургии. Актуальность проблемы обусловлена прогрессивным ростом заболеваемости, связанной с ХАННК [1].

2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение эффективности усовершенствованной методики ДАС при гнойно-некротических осложнениях ХАННК, разработанной на кафедре хирургических болезней №2 с курсом урологии УО «ГрГМУ»..

3. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования служили 116 больных с гнойно-некротическими осложнениями ХАННК атеросклеротического и диабетического генеза, которым были выполнены ДАС. Предметом исследования были непосредственные результаты лечения этих больных.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате проведенных исследований установлено, что дистальные ампутации стопы при ГНО ХАННК, выполненные по классическим методикам, в 82,5% случаев сопровождаются местными послеоперационными осложнениями. Это приводит к неудовлетворительным результатам лечения в целом. Одной из причин осложнений являются циркуляторные нарушения, вызванные следующими техническими моментами оперативного вмешательства: использованием разрезов, не учитывающих особенностей кровоснабжения стопы, повреждением плюсневых и пальцевых артерий при выделении головок плюсневых костей, применением чрескожных швов при ушивании послеоперационной раны. Предлагаемая методика ампутации пальцев и сегментов стопы, позволяет уменьшить число местных послеоперационных осложнений с 82,5% до 46%, и тем самым ограничить распространение гнойно-некротического процесса на проксимальные отделы стопы, что приводит к снижению количества ВАНК с 30% до 10,5%, сокращению срока лечения и существенному улучшению социальной и трудовой реабилитации данной категории больных.

Результаты исследования внедрены в хирургическом отделении ГКБСМП г. Гродно и в учебный процесс на кафедре хирургических болезней № 2 с курсом урологии ГрГМУ.

Литература

1. Абышов, Н.С. Ближайшие результаты «больших» ампутаций у больных с окклюзионными заболеваниями артерий нижних конечностей / Н.С. Абышов, Э.Д. Закирджаев // Хирургия. – 2005. – № 11. – С. 15-19.