

МЕСТО МАЛОИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

А. Г. СУРБА, К. Н. ЖАНДАРОВ

The study describes new microinvasive technologies of the varicose disease treatment. The differences with the classic surgical approach and benefits of the microinvasive surgery are presented

Ключевые слова: варикозное расширение вен, миниинвазивные принципы лечения, эндовазальная лазерная коагуляция

1. ВВЕДЕНИЕ

Варикозная болезнь нижних конечностей (ВБНК) является наиболее распространенной патологией периферических сосудов. Ключевое место в лечении варикозной болезни, наряду с консервативными методами, занимает хирургический метод (флебэктомии по Троянову-Тренделенбургу, Бэбкоку, Нарату). Эндовенозная лазерная фотокоагуляция (ЭВЛК) – относительно новый минимально инвазивный способ, применяющийся в лечении ВБНК [1].

2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Улучшить результаты хирургического лечения больных варикозной болезнью нижних конечностей за счет применения менее инвазивных методов.

3. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом для исследования стали результаты лечения ВБНК у 561 пациента, лечившихся в Гродненской областной клинической больнице в 2010-2011 гг. Из них 67 пациентам использовали метод ЭВЛК.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ

Полученные данные убедительно свидетельствуют о том, что метод лечения с применением ЭВЛК под УЗИ контролем, помимо высоких показателей клинической эффективности дает столь существенное улучшение качества жизни, что может быть рекомендовано как метод выбора в лечении больных с разными формами ВРВ нижних конечностей. При использовании ЭВЛК совместно с традиционным хирургическим лечением и ЭДПВ, значительно уменьшает все основные проявления заболевания, устранились даже наиболее тяжелые из них. Немаловажным является возможность уменьшения ограничений среди пациентов по возрасту и состоянию здоровья для проведения операции. Данный метод может быть рекомендовано для использования в любом стационаре общехирургического профиля.

Выполняя весь спектр операций при варикозной болезни, в том числе при ее осложненных формах, мы всегда рекомендуем ЭВЛК пациентам, ведущим активный образ жизни. Сопоставимая по эффективности с традиционными операциями и мини - флебэктомией, эндовазальная лазерная коагуляция несомненно в разы превосходит их по косметичности, а также по срокам реабилитации и восстановления трудоспособности..

Литература

1. *Гужков, О.Н.* Оценка эффективности сочетанного применения эндовазальной лазерной коагуляции и экосклеротерапии в комплексном лечении осложненных форм варикозной болезни / О.Н. Гужков // *Ангиол. и сосуд. хир.*-2007.-№ 3.-С. 95-99.