СРАВНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

М. Н. Мицкевич

НИИ прикладных проблем математики и информатики

Минск, Беларусь

E-mail: mitskevich_m@mail.ru

Рассмотрены два критерия обнаружения неоднородностей временных рядов, основанные на вейвлет-преобразовании. Проведен сравнительный анализ эффективности критериев с помощью статистического моделирования.

Ключевые слова: временной ряд, разладка, вейвлет-преобразование, пороговое значение, критерий, эффективность.

ВВЕДЕНИЕ

Для выявления локальных неоднородностей и, в частности, разладок широко применяется вейвлет-анализ [1–3]. Основная идея его применения заключается в том, что абсолютные значения вейвлет-коэффициентов, в силу свойства локальности вейвлет-преобразования, имеют максимальные значения в моменты разладок [2, 3]. В литературе описано много методов обнаружения неоднородностей, но сравнительный анализ различных критериев проводился редко [1].

Наиболее часто для построения решающих правил используются два подхода. Первый заключается в поиске превышающих порог вейвлет-коэффициентов. Второй подход основан на построении статистик от вейвлет-коэффициентов, нахождении их распределения и вычислении p -значения для нулевой гипотезы.

Эти подходы были использованы для построения критерия, основанного на сумме квадратов вейвлет-коэффициентов, превышающих модифицированный универсальный порог $\delta = \sigma\sqrt{\log(n)a_n}$, где $a_n = c(\log n)^{-b}$, b и c – некоторые константы.

Для сравнения был выбран критерий, основанный на значениях вейвлет-коэффициентов. Со статистической точки зрения проблема обнаружения разладок с использованием вейвлет-коэффициентов может быть также рассмотрена как проблема множественной проверки гипотез относительно распределения вейвлет-коэффициентов.

Методом статистического моделирования получены оценки вероятности ошибок первого и второго рода критериев, произведен их сравнительный анализ.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Рассмотрим временной ряд:

$$X(t) = \{x_t \mid t = 0, \dots, T-1\}, T = 2^M, M \in N. \quad (1)$$

Временной ряд (1) имеет разладку в неизвестный момент времени $t_0 \in \{v_-, v_- + 1, \dots, v_+\}$, где $0 < v_- < v_+ < T - 1$ – некоторые априорно заданные граничные значения, и состоит из фрагментов стационарных временных рядов:

$$X(t) = f(t) + z_t, f(t) = \begin{cases} \mu, & 0 \leq t \leq t_0 - 1, \\ \mu + \tau, & t \geq t_0, \end{cases} \quad t = 0, \dots, T - 1, \quad (2)$$

где $z_t \sim N(0,1)$ – независимые в совокупности стандартные случайные величины.

Определим нулевую гипотезу H_0 , состоящую в том, что временной ряд (1) является стационарным ($\tau = 0$), и альтернативную гипотезу H_1 , означающую наличие во временном ряду разладки (2).

Определим дискретное вейвлет-преобразование временного ряда (1)[1]:

$$d_{j,k}^{(\psi)} = \sum_{t=0}^{T-1} x_t \psi_{j,k}(t), j = 1, \dots, M, k = 0, \dots, 2^{M-j} - 1, \quad (3)$$

где $\psi_{j,k}(t) = 2^{-j/2} \psi(2^{-j}t - k)$, $\psi(t)$ – базисный вейвлет, j – параметр масштаба (уровень разрешения), k – параметр сдвига. В качестве базисного вейвлета $\psi(t)$ будем использовать вейвлет Хаара, который образует ортонормированный базис:

$$\psi_{j,k}^H(x) = \begin{cases} 2^{-j/2}, & 2^j k \leq x \leq 2^j (k + 1/2), \\ -2^{-j/2}, & 2^j (k + 1/2) \leq x \leq 2^j (k + 1), \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (4)$$

При выполнении нулевой гипотезы H_0 вейвлет-коэффициенты (3) временного ряда (1), вычисленные с использованием вейвлета Хаара (4), на каждом уровне разрешения $j = 1, \dots, M$ независимы и имеют асимптотически стандартное нормальное распределение $d_{j,k}^{(\psi)} \xrightarrow{D} N(0,1)$ [4].

КРИТЕРИЙ, ОСНОВАННЫЙ НА ЗНАЧЕНИЯХ ВЕЙВЛЕТ-КОЭФФИЦИЕНТОВ

Если временной ряд (1) является однородным, то все вейвлет-коэффициенты статистически незначимо отличаются от нуля и по абсолютной величине не превосходят определенного порогового значения. Это пороговое значение будем определять исходя из следующих предположений.

Исходные гипотезы H_0 и H_1 о распределении вероятностей ряда (1) можно заменить набором индивидуальных гипотез H_{0jk} и H_{1jk} о распределении каждого вейвлет-коэффициента, для которых строится набор решающих правил:

$$\text{принимается} \begin{cases} H_{0jk}, & \text{если } d_{j,k}^{(\psi)} \sim N(0,1), \\ H_{1jk}, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Гипотеза H_0 принимается в том случае, если принимаются все гипотезы H_{0jk} , и альтернативная гипотеза H_1 принимается, когда принимается хотя бы одна из гипотез H_{1jk} .

Построим алгоритм тестирования вейвлет-коэффициентов, состоящий из следующих шагов и основанный на подходе из статьи [5].

1. Для каждого вейвлет-коэффициента $d_{j,k}^{(\Psi)}$ в предположении, что выполняется нулевая гипотеза H_{0jk} , вычисляется двухстороннее p -значение $p_{jk} = 2(1 - \Phi(|d_{j,k}^{(\Psi)}|))$, где $\Phi(\cdot)$ – функция стандартного нормального распределения $N(0,1)$.

2. Вычисленные p -значения p_{jk} упорядочиваются по возрастанию $p_{(1)} \leq p_{(2)} \leq \dots \leq p_{(n)}$, где каждое значение $p_{(i)}$ соответствует определенному вейвлет-коэффициенту $d_{j,k}^{(\Psi)}$, $n = T - 1$.

3. В построенном вариационном ряду для всех $i = 1, \dots, n$ проверяется условие $p_{(i)} \geq (i/n)\alpha$, где α – заданный уровень значимости. Если это условие выполняется, то принимается индивидуальная гипотеза $H_{0(i)}$.

4. Если найдено l , что для всех $i = 1, \dots, l$ выполняется $p_{(i)} < (i/n)\alpha$, то принимаются индивидуальные гипотезы $H_{1(i)}$ и вычисляется пороговое значение $\lambda_i = \Phi^{-1}(1 - p_{(i)}/2)$, с помощью которого можно определить оценку момента разладки.

КРИТЕРИЙ, ОСНОВАННЫЙ НА СУММЕ КВАДРАТОВ ВЕЙВЛЕТ-КОЭФФИЦИЕНТОВ

Обозначим последовательность вейвлет-коэффициентов:

$$y_i = d_{j,k}^{(\Psi)}, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, M, k = 0, \dots, 2^{M-j}, n = T - 1. \quad (5)$$

Затем построим статистику по сумме квадратов коэффициентов (5), превышающих порог $\delta = \sigma\sqrt{2\log(na_n)}$:

$$\hat{Q}^* = \sum_{i=1}^n y_i^2 I(|y_i| > \delta), \quad (6)$$

где $I(\cdot)$ – индикаторная функция.

В [6] были доказаны следующие теорема и следствие.

Теорема. Если выполняется гипотеза H_0 и $a_n \log^{1/2} n \rightarrow 0$, тогда статистика $\hat{Q}^*$ имеет асимптотически нормальное распределение.

Обозначим $\hat{Q} = \sigma_n^{-1}(\hat{Q}^* - \mu_n)$, где $\mu_n = \sqrt{2/\pi}\sigma^{-1}a_n^{-1}\delta(1 + \delta^{-2})$ и $\sigma_n^2 = \sqrt{2/\pi}\sigma^{-1}a_n^{-1}\delta^3(1 + 3\delta^{-2})$.

Следствие. Статистика $\hat{Q}$ имеет асимптотически стандартное нормальное распределение $\hat{Q} \xrightarrow{D} N(0,1)$.

Для статистики критерия мы используем $a_n = \log^{-3} n$. При H_0 $y_{\max} = \max_{1 \leq i < n} y_i \approx (2\log n)^{1/2}$ и имеет большее значение при выполнении альтернативной гипотезы. Заменяем $\log n$ на $y_{\max}^2/2$ для максимизации мощности критерия, не увеличивая ошибку первого рода. Тогда $\hat{a}_n = \min(8y_{\max}^{-6}, \log^{-3} n)$.

Решающее правило для критерия с уровнем значимости α определяется следующим образом:

$$\begin{aligned} & \text{принимается } H_0, \text{ если } \Phi(\mathcal{G}) \leq 1 - \alpha, \\ & H_1, \text{ иначе.} \end{aligned}$$

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРИТЕРИЯ

Для оценки эффективности построенного критерия на модельных данных были вычислены оценки вероятности первого и второго рода.

Число моделируемых рядов для оценки вероятности ошибок первого и второго рода каждого критерия – $K = 1000$.

Для оценки вероятности ошибок первого рода моделировались стационарные временные ряды длиной $T = 2^8, 2^9, 2^{10}, 2^{11}$. Уровень значимости для проверки нулевой гипотезы H_0 полагался равным $\alpha = 0.05$. Полученные оценки вероятности ошибок первого рода для всех анализируемых длин временных рядов не превышали заданный уровень значимости α .

Для оценки вероятности ошибок второго рода моделируемые временные ряды состояли из двух однородных фрагментов длиной $T_1 = T_2 = T/2$ с разладкой в моменты $t_0 = 2^7, 2^8, 2^9, 2^{10}$. Величина скачка принимала значения $\tau \in \{0.05, 0.1, \dots, 0.7\}$.

На рисунках 1–2 приведены графики мощности критериев для длин ряда 2^8 и 2^{11} : А – критерий, основанный на сумме квадратов вейвлет-коэффициентов, Б – критерий, основанный на значениях вейвлет-коэффициентов.

Рис. 1. Оценка мощности критериев для ряда длиной 2^8

Рис. 2. Оценка мощности критериев для ряда длиной 2^{11}

Из графиков, приведенных на рис. 1–2, видно, что мощность критериев возрастает с ростом величины скачка и длины временного ряда. Критерий, основанный на значениях вейвлет-коэффициентов, имеет преимущество при работе с рядами большей длины, но проигрывает по мощности при работе с временными рядами длиной меньше чем 2^9 .

ЛИТЕРАТУРА

1. *Nason, G. P.* "Wavelet Methods in Statistics with R (Use R) / G. P. Nason, Springer-Verlag, 2010, 257 p.
 2. *Wang, Y.* Jump and sharp cusp detection by wavelets / Y. Wang // *Biometrika*. 1995. Vol. 82. P. 385-397.
 3. *Chiann, C.* Wavelet Analysis for Times Series / C. Chiann, P. A. Morettin // *Journal of Nonparametric Statistics*. 1998. № 10. P. 63–91.
 4. *Мицкевич, М. Н.* Обнаружение разладок временных рядов с использованием вейвлет-преобразования / М. Н. Мицкевич // Информационные системы и технологии (IST'2006): третья Международная конф. (Минск, 1–3 ноября 2006 г.): материалы: в 2 ч. Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2006. Ч. 2. С. 184–189.
 5. *Simes, R. J.* An improved Bonferroni procedure for multiple tests of significance / R. J. Simes // *Biometrika*. 1986. Vol. 73. P. 751–754.
 6. *Mitskevich, M. M.* Change-point detection based on thresholding statistic / M. M. Mitskevich // *Computer Data Analysis and Modeling: Complex Stochastic Data and Systems : Proc. of the Ninth Intern. Conf., Minsk, Sept 7–10, 2010*. In 2 vol. Vol. 1. Minsk : Publ. center of BSU, 2010. P. 253–256.
-